

Klinische Beiträge
zu den malignen
Nebenhöhlentumoren.



INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der medizinischen Doktorwürde
einer hohen medizinischen Fakultät der Albert-
Ludwig-Universität zu Freiburg i. Br.

vorgelegt von
LISELOTTE WITKOP
aus Gelsenkirchen.

1 * 9 * 3 * 3

Gedruckt in der Werkdruckerei Chr. Janzon in Gelsenkirchen



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Klinische Beiträge zu den malignen Nebenhöhlientumoren.

Echte Geschwülste, die man auch Neoplasmen oder nach Klebs, weil sie aus keimenden Zellen bestehen, Blastome nennt sind „Wachstumsexcelle vom autonomen Charakter (Borst).“ Diese Autonomie ist die Hauptcharaktereigenschaft eines echten Blastoms, das keine Schranken kennt in seinem Wachstum und auch vor dem Knochen nicht Halt macht. Ohne Nerven und vom Gesamtorganismus in hohem Maße unabhängig, entziehen sie ihm große Mengen Ernährungsmaterial und ruinieren durch ihr parasitisches Dasein den Geschwulstträger.

Ein weiteres wichtiges Merkmal zeigt sich in der Minderwertigkeit des Geschwulstgewebes gegenüber dem Normalgewebe, dessen Struktur und Funktion wohl in den Geschwülsten wiederkehren, nie aber das normale Vorbild erreichen. Ist die Abweichung vom Normaltypus sehr gering, so spricht man von homologen Geschwülsten, von Blastomen mit weit vorgeschrittener Gewebsreife. Ihnen gegenüber stehen solche Gewebsneubildungen, die morphologisch, wie funktionell vom Muttergewebe sehr abirren. Oefter besteht dann eine Analogie zwischen Geschwulstgewebe und früheren Entwicklungsstadien des Mutterbodens. Diese Geschwülste werden als heterologe oder als Blastome mit unvollkommener Gewebsreife bezeichnet (Borst). Die unreifen Geschwülste pflegen im allgemeinen im klinischen Sinne bösartig, die reifen gutartig zu sein.

Was die bösartigen Geschwülste betrifft, die hier besprochen werden sollen, so charakterisieren sie sich noch durch weitere spezifische Eigenschaften in ihrem morphologischen Aufbau. Man kann dabei unterscheiden zwischen spezifischem **Geschwulstparenchym** und dem **Geschwulststroma** d. h. dem unspezifischen Stützgewebe, das die Gefäße führt.

Das **Parenchym** der malignen Geschwülste besteht aus den spezifischen Geschwulstzellen, die stark vom morphologischen Muttergewebstypus abweichen. So zeigen die malignen Geschwulstzellen einen Größenunterschied gegenüber den Mutterzellen, auch nimmt ihre Kerngröße oft erheblich zu, während das Protoplasma sich verringert. In ein und derselben Geschwulst kann die Kerngröße Schwankungen unterworfen sein, sehr bedeutend z. B. beim Carcinom. Nicht nur Größe, sondern auch Gestalt, Struktur, Chromatingehalt der Kerne können sehr wechseln.

Anomalien gegenüber den Mutterzellen äußern sich auch in der **Vermehrung der Geschwulstzellen**. Hier zeigen die malignen Geschwülste besonders pathologische Formen wie asymmetrische, hypo- und hyperchromatische, multipolare Mitosen, auch falsche Verteilung der Chromosomen.

Die **Funktion** der Geschwulstzellen kann der normalen Funktion des Muttergewebes gleichkommen, meist aber sind die gelieferten Produkte nicht verwertbar, da sie einmal nicht an der richtigen Stelle abgeführt werden können, und zweitens die gebildeten Sekrete chemisch den normalen nicht gleichkommen. Andererseits können die Funktionen des Muttergewebes in den Geschwülsten gestört, vermindert oder ganz aufgehoben sein, manchmal auch gesteigert. (Schleimkrebs, Pigmentsarkome).

Das **Stroma** der Geschwülste ist entweder ursprünglich vorhandenes, präformiertes Gewebe, oder aber neugebildetes. Ausgangspunkt für die Neubildung des Stromas ist gewöhnlich das Gewebe, in dem sich die Geschwulst bildet, in anderen Fällen sind die Geschwulstzellen selbst Bildner des Stützgewebes. Das Stroma der Geschwülste ist in der Regel Bindegewebe, selten Schleimgewebe. Bei manchen Geschwulstformen übt das Parenchym einen pathologischen Wachstumsreiz auf das Stroma aus; die Zellen gewisser Krebse z. B. regen das Knochengewebe zu übermäßig starker Wucherung an (Borst). Das Stroma führt die Blutgefäße, die speziell beim Carcinom nach Studien Goldmanns reichlich und von sehr unregelmäßiger Anordnung sein können. Große Stämme fehlen fast völlig; man findet vorwiegend kleine und kleinste Gefäße, die sich rasch in Kapillaren auflösen.

Eine absolute morphologische Spezifität auch für die maligne Tumorzelle ist bis heute noch nicht festgestellt, in

malignen Geschwülsten ist überhaupt die Variabilität in der individualistischen Ausgestaltung ihres Aufbaues sehr groß! (Borst).

Die letzte **Ursache der Geschwulstbildung** ist trotz eingehendster Forschungen bis heute noch unbekannt. Es haben sich im Laufe der Zeit verschiedenste Entstehungstheorien herausgebildet, von denen ich die wichtigsten anführen möchte:

Die bekannteste und auch heute noch vielfach anerkannte Theorie der Geschwulstentstehung ist die **Irritations- oder Reizungstheorie**. Nach ihr kommt eine Geschwulstbildung zustande auf Grund von exogenen, außerhalb der geschwulstbildenden Zellen gelegenen Faktoren. Diese Theorie hat erheblich an Boden gewonnen, seit es gelungen ist, durch Aufpinselung von Teer an weißen Mäusen Carcinome zu erzeugen und diese sogar auf Kaninchen zu übertragen. Dabei ist zu bemerken, daß seltener ein einmaliges, physikalisches Trauma, als vielmehr eine chronische Irritation mechanischer oder chemischer Art eine Geschwulstentstehung zu verursachen scheint (Borst). Nach Sauerbruch sollen dabei nach einmaliger Gewaltseinwirkung Sarkome, nach wiederholten und andauernden Reizen Carcinome entstehen können. Er hält es auch für möglich, daß durch Verdrängung und Verschiebung einzelner Zellen aus ihrem Verbands (Bluterguß) oder durch chemische Beeinflussung, die sich aus den Heilungsvorgängen ergibt (Wundhormone), ja allein schon durch die Heilungshydraemie und ihren gesteigerten Stoffwechsel die für die Tumorentstehung notwendigen Änderungen eines Zellverbandes entstehen können. Das mittlere Keimblatt besitzt die besondere Fähigkeit, auf körperliche Schädigungen mit blastomähnlichen Wucherungen zu antworten. Borst betont dann noch eine Geschwulstentstehung auf dem Boden von chronischen Entzündungen und im Zusammenhang von geschwürigen, narbigen Prozessen, die ebenfalls als chronische Irritationen wirken. Häufig kann zwischen Einwirkung des Reizmittels und der Entwicklung des Krebses eine lange Latenzzeit liegen. Das zeigen die experimentellen Teerversuche, Röntgencarcinome, Krebs der Anilinarbeiter etc.

Was die Oberkiefer Tumoren betrifft, so führen viele Autoren ihre Entstehung auf exogene Reize zurück (Bronner und Krummbein, Moral, Pichler, Quick, Lindemann). Als

ursächliche Auslösungsmomente werden angeführt: Tabakgenuß, vor allem bei starken Rauchern durch die Länge der Einwirkungszeit, ferner scharfe Zahnkanten abgebrochener Zähne, schlecht sitzende Kronen, drückende Gebisse und überhängende Füllungen. Auch der Leukoplakie kann nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet werden; sie ist, wie einwandfrei festgestellt worden ist, recht oft der Vorgänger des Krebses. Jeder, der an dieser Erkrankung leidet, sollte unter dauernder Kontrolle stehen und wenigstens alle zwei Monate sich einer Untersuchung unterziehen. (Moral).

Die Tatsache, daß viele Geschwülste auch ohne nachweisbare lokale Gewebsreizung, scheinbar spontan, entstehen und daß auch die experimentelle Geschwulstforschung keine absoluten Beweise bringen konnte, kann die Reiztheorie nicht als ausschlaggebend gelten lassen. Man kann bei ihr ohne die Annahme einer gleichzeitig bestehenden individuellen **Disposition** kaum auskommen. Damit komme ich zu einer zweiten Theorie der Geschwulstentstehung.

Was die Vererbung des Krebses betrifft, so ist sie noch wenig geklärt. Sie wird von einigen Autoren anerkannt, sie messen ihr eine nicht geringe Bedeutung bei; andere Kliniker und Pathologen dagegen lehnen die Tatsache einer Vererbung ab. In vielen Tierversuchen an Mäusefamilien, bei denen Spontanumoren auftraten oder fehlten, ferner an Familien, die für Tumorigmpfung besonders empfindlich waren, haben Forscher die Vererbbarkeit der Disposition zur Gewächsbildung nachweisen wollen. Ebenso wie eine gewisse Empfänglichkeit für Carcinom, soll auch eine Widerstandskraft gegen Krebs vererbbar sein. Alle diese Annahmen sind noch zu wenig bewiesen, um sie als eine allgemein gültige Norm anerkennen zu können. Immerhin rät Schmieden, daß eine Heirat unter Angehörigen von beiderseits notorisch stark krebsbelasteten Familien vermieden werden solle!

Nach **Cohnheim** gehen die Blastome aus Gewebskeimen hervor, die bei der Entwicklung überschüssig gebildet, ausgeschaltet und eventuell verlagert wurden. Dafür sprechen die kongenitalen Geschwülste, auch solche, die sich später entwickeln, in deren Gewebe man aber einen embryonalen Charakter entdecken kann. Ferner, Geschwülste an Stellen besonders komplizierter Entwicklungsvorgänge im Bereich von embryonalen Spalten. Doch ist eine solche angeborene

Grundlage bis jetzt nicht für alle Geschwülste, vor allem nicht für Carcinom, zu erweisen. Ein Vergleich oder gar eine Identifizierung von Geschwulstzellen mit embryonalen Zellen scheint schon deshalb nicht glaubhaft, weil die embryonalen Zellen sich zwar durch eine große Wachstumsenergie auszeichnen, aber stets bei ihrem Wachstum Normalgebilde aufbauen, während die Geschwulstzellen in ihrem Wesen und ihren Leistungen durchaus pathologisch sind. Die Cohnheim'sche Theorie läßt also in causaler Beziehung das Geschwulstproblem ungelöst.

Borst glaubt in den Zellen selbst, in einer „fundamentären primären Wesensveränderung der Zelle“ die Grundlage der Geschwulstbildung zu sehen. Für diese Ansicht sprechen Abweichungen der Geschwulstzellen bei morphologischen, chemischen und biologischen Untersuchungen von den normalen Zellen. Allerdings ist eine absolut spezifische Eigenart der Geschwulstzelle noch nicht nachgewiesen, wenn auch eine Verminderung der biochemischen Empfindlichkeit und eine Erhöhung der selbständigen Existenzfähigkeit als besondere Eigenschaften der Geschwulstzellen angesehen werden müssen. Eine ähnliche Ansicht äußert Fischer-Wasels in einem Artikel: „Das Geschwulstproblem“ (Dtsch. med. Wochenschr. 1928 Nr. 28):

„Das Wesen der Geschwulst liegt in der spezifischen Metastruktur der Geschwulstzelle selbst, deren besondere biologische Eigenschaften in erster Linie bei der Transplantation der Gewebszüchtung und im Stoffwechsel hervortreten. Jede Geschwulst geht aus einer besonderen Geschwulstkeimanlage hervor und bildet sich nach typischer Latenzzeit in bestimmten Zeiten besonderer Disposition aus. Geschwulstkeimanlagen entstehen ausschließlich bei zwei biologischen Vorgängen:

1. Durch Störung der primären Organ- und Zelldifferenzierung.
2. Durch Störung der Regenerationsvorgänge.

Beide Thesen sind durch Beobachtung von Spontantumoren bei Mensch und Tier zu beweisen, beide sind auch heute experimentell gut begründet“.

Verfasser betont, ebenso wie auch Borst, ausdrücklich, daß neben der angenommenen primären Zellveränderung für die Entstehung der Geschwülste, vor allem auch der malignen Geschwülste, die Verhältnisse des Gesamtorganismus (Wachstumsperiode, Pubertät, Gravidität, Greisenalter), sowie der Eintritt eines Organs oder Organsystems (Uterus, Ovarien) in eine bestimmte Lebensphase von größter Wichtigkeit sind. Dabei spielen die irritativen Faktoren insofern eine Rolle, als sie bei vorhandener Disposition den bösartigen Krankheitsprozeß auslösen oder begünstigen können.

Andere Autoren glauben pflanzliche **Bakterien**, insbesondere tierische **Parasiten**, als ursächliches Moment für die Entstehung von Tumoren ansehen zu müssen. So berichtet Reichert von interessanten Versuchsergebnissen, die er bei Ratten mit der Impfung von Tumorbrei erzielte. Die Transplantation dieser bacillogenen Tumoren gelang gut, besonders, wenn man 2 Injektionen von Tumorbrei in gewissen zeitlichen Abständen vornahm. Auch Heidenhain ist auf Grund von langjährigen experimentellen Versuchen zu der Ueberzeugung gelangt, die Krebskrankheit als eine Infektionskrankheit bezeichnen zu können. Dagegen erscheint Borst ein parasitärer Ursprung für die echten Geschwülste unwahrscheinlich. Was die experimentellen Ergebnisse betrifft, so nimmt er an, „daß das Toxin chronische Entzündungen und atypische Wucherungen des Epithels hervorruft und daß dann schließlich im Laufe der fortgesetzten regenerativen Zellteilungen jene pathologische Zellvariation entstehe, welche der echten Blastomzelle entspräche“.

Gye und Barnard glaubten ein invisibles, lebendiges Krebsvirus gefunden, gezüchtet und sichtbar gemacht zu haben; aber alle diese Versuche, einen spezifischen Universalgeschwulsterreger zu finden, sind bisher gescheitert, so daß die parasitäre Theorie vorläufig als zu wenig bewiesen, abgelehnt werden muß.

Kurz sei noch die Möglichkeit der **Umwandlung von gutartigen Geschwülsten in bösartige** gestreift. In Bezug auf die Kiefertumoren spricht Lindemann für die Entstehung maligner Tumoren und glaubt an eine Entwicklung derselben auf dem Boden von Gefäßnaevi, Atheromen, Epithelcysten, Dermoiden und Teratomen. Durch Billroth's Untersuchungen hat der Glaube an diese Umwandlungstheorie einen argen Stoß erlitten. Im allgemeinen haben dahingehende Untersuchungen und Sammelforschungen festgestellt,

daß die Umwandlung ein sehr seltenes Ereignis ist. In den meisten Fällen handelt es sich um ein Nebeneinander von gutartigen und malignen Neoplasmen, wo der maligne Charakter erst nach längerer Latenzzeit ins Auge fällt, während die gutartige Geschwulst schon eher bemerkt wurde. Es kann aber auch eine gutartige Geschwulst durch entzündliche Prozesse in der Umgebung maligne Geschwulstbildungen erzeugen, also als irritatives Moment wirken, bezw. ein häufiges operatives Angehen eines gutartigen Tumors (Polyp) ein auslösendes Moment für ein malignes Wachstum sein.

Ausgehend von den Gewebsarten, aus denen die Tumoren hervorgehen und aus welchen sie sich dementsprechend zusammensetzen, können wir bei den Kiefergeschwülsten unterscheiden zwischen Tumoren, ausgehend vom Epithel-Carcinomen; Tumoren, die sich aus Geweben der Bindefsubstanzgruppe zusammensetzen, — Sarkomen und den seltenen Endotheliomen.

Das **Carcinom** des Oberkiefers hat als Mutterboden das Epithel des Zahnfleisches, der Schleimhaut des Alveolarfortsatzes und des Gaumens. Es ist ein Plattenepithelcarcinom mit Neigung zu Verhornung und Bildung von Schichtungskugeln. In seinen ersten Entwicklungsstadien erhebt sich der Plattenepithelkrebs meist mehr oder minder über das Niveau der übrigen Umgebung und führt dabei nicht selten zu einer starken papillären Wucherung des Stromas, wodurch zottige oder blumenkohlartige Formen zustande kommen. Auf den ersten Blick gleichen sie den gewöhnlichen Papillomen und Zottengeschwülsten, unterscheiden sich aber von ihnen durch ihr Eindringen in tiefere Gewebsschichten und führen meist zu baldiger Ulceration. Am Alveolarfortsatz ist diese geschwürige Form mit wallartig aufgeworfenen harten Rändern am Zahnfleisch die weitaus häufigere. In anderen Fällen breitet sich die krebige Wucherung von Anfang an wesentlich in die Tiefe aus, wo sie bald auf den Knochen übergreift, der verdickt und stellenweise erweicht wird. Die Zähne lockern sich und fallen aus. Sehr bald wird auch das Innere des Sinus maxillaris mitergriffen. Häufig ist die Kieferhöhle selbst erster Ausgangspunkt für eine Krebsgeschwulst. Obwohl sie als Schleimhaut flimmerndes Cylinderepithel trägt, zeigt auch sie am häufigsten die Form des Plattenepithelkrebses. Zur Erklärung für diese zunächst etwas befremdlich erscheinende Beobachtung führen Harmer und Glas einige Entstehungsarten an:

1. Es kommt zu einer Epithelmetaplasie, bei der das ursprüngliche Cylinderepithel in Plattenepithel umgewandelt wird. Diese Metaplasie kann entstehen auf dem Boden von chronischen Entzündungen.

2. Kilian wies als Erster auf eine Entwicklung des Plattenepithelkrebses der Kieferhöhle auf dem Boden von Mallafesz'schen paradentären Zahnkeimen.

3. Nach der Cohnheim'schen Theorie können epitheliale Geschwülste hervorgehen aus versprengten, embryonalen Plattenepithelinseln in der Schleimhaut der Kieferhöhle.

Als häufigste Entstehungsart darf heute die metaplastische Umbildung des Cylinderepithels in ein Plattenepithel und ein hieraus entstehender Plattenepithelkrebs angesehen werden. Das Epithel des Carcinoms zeigt ein eigenmächtiges und destruierendes Wachstum. Während bei den gutartigen Formen der Geschwülste Epithel und Bindegewebe ein reguläres, typisches Zusammenwirken erkennen lassen, handelt es sich beim Carcinom vor allem um eine durchaus selbstständige Aktion der Epithelien. Die Epithelwucherung steht beim Carcinom durchaus im Vordergrund. Das Bindegewebe wird vom Epithel durchwachsen und spielt nur eine untergeordnete Rolle als gefäßführendes Stützgerüst (Stroma) der epithelialen Neubildung, des sogenannten Krebsparenchyms. (Borst).

Häufiger noch als die Plattenepithelkrebs sind die Cylindercarcinome der Oberkieferhöhle. Sie nehmen ihren Ausgangspunkt von dem Cylinderepithel der Mucosa oder von den Drüsen, die sich regelmäßig zwischen den Epithelien der normalen Mucosa befinden. Manche Cylinderepithelcarcinome bilden adenomähnliche Formen, indem statt solider Epithelzapfen und -nester, schlauchförmige, drüsenähnliche, mit einem deutlichen Lumen versehene Wucherungen auftreten. Von diesen Formen besteht ein direkter Uebergang zu dem sogenannten Adenocarcinom. In diesem verrät sich der carcinomatöse Charakter der Geschwulst dadurch, daß der Epithelbelag wenigstens stellenweise mehrschichtig und unregelmäßig ist. Da und dort ist das Lumen ganz von Epithelmassen ausgefüllt, so daß neben drüsenähnlichen Gebilden auch kompakte Nester polymorpher Zellen gewuchert sind. So gehen die Schlauchformen allmählich in solide Zellmassen über. Oft finden sich nur diese; hierbei sind auch in ihnen

wenigstens die äußeren, dem Stroma zugerichteten Zellen oft noch von cylindrischer Gestalt. Das Cylinderepithelcarcinom tritt in knotigen oder flächenhaften, meist frühzeitig ulcerierenden Wucherungen der Kieferhöhlenschleimhaut auf. Wächst die Geschwulst nach der Oberfläche zu, so entstehen auch hier oft blumenkohlartige Wucherungen.

Die Epithelien der Cylinderzellenkrebse können einer schleimigen oder kolloiden Degeneration verfallen, die mit starker cystischer Erweiterung der Drüsenräume einherzugehen pflegt, da diese mit der schleimigen oder kolloiden Masse ausgefüllt werden. Diese Gallertkrebse breiten sich vorwiegend der Fläche nach aus und infiltrieren meist auf weite Strecken hin die Schleimhaut.

Carcinome, die an oder im Knochen wachsen, können das umgebende Stroma zu intensiver Knochenbildung reizen. Man nennt sie osteoplastische Carcinome. Hierbei wandelt sich das Bindegewebe in Knochengrundsubstanz um, deren Verkalkung dann rasch vor sich geht. Bei einer derartigen plastischen Wirkung auf das Knochengewebe kann man nach Borst an spezifisch chem. Stoffe denken, durch welche die Krebszellen die Knochenbildungszellen zu starker Produktion von Knochengewebe anregen sollen.

Die **Sarkome** sind Bindefsubstanzgeschwülste, welche dauernd auf einem Stadium unvollkommener Gewebsausbildung stehen geblieben sind und deren vorwiegender Bestandteil durch Zellen dargestellt wird. In einer qualitativ wie quantitativ mehr oder weniger unvollkommenen Ausbildung der Grundsubstanz zeigt sich die mangelhafte Gewebsreife dieser Geschwülste (Borst). Ihre Malignität äußert sich durch infiltrierendes und destruierendes Wachstum, Recidivfähigkeit und Metastasenbildung.

Es ist sehr schwierig festzustellen, von welchen Teilen des Oberkiefers oder der Oberkieferhöhle die Sarkome ausgehen, ob von der Schleimhaut, vom Perichondrium und Periost, ob vom Knorpel oder Knochen, da ein in der ersten Entwicklung begriffenes Sarkom sich kaum von einer regenerativen Neubildung der Bindefsubstanz unterscheiden läßt. Auch können die in der Umgebung eines Sarkoms sich abspielenden reaktiven Wucherungen an Bindefsubstanz und Gefäßen, die nichts mit beginnender sarkomatöser Umwandlung zu tun

haben, sondern eine kollaterale Hyperplasie darstellen, leicht irrtümliche Deutungen hervorrufen. Borst hält es in vielen Fällen für wahrscheinlich, daß die Sarkomentwicklung gar nicht von normal ausdifferenzierten Gewebsbezirken ihren Ausgang nimmt, sondern von einem Zellmaterial, welches bei der Entwicklung unverbraucht liegen geblieben war, oder sich fehlerhaft differenziert hatte. Für eine kongenitale Anlage der Sarkome spricht das Vorkommen von fetalen und angeborenen Sarkomen, von heterotropen sarkomatösen Mischgeschwülsten, ferner der Zusammenhang von Gewebs- bzw. Organmißbildungen mit Sarkomentwicklung. Sarkome des Oberkiefers gehen entweder als periphere vom Periost aus, oder es sind centrale, myelogene Sarkome. Die periostalen Sarkome sitzen dem Knochen auf und zeigen eine glatte Oberfläche, die von unveränderter Schleimhaut und Haut überzogen ist. Die Konsistenz kann eine sehr verschiedene sein. Die sehr zellreichen Sarkome sind so weich, daß sie beim Einscheiden förmlich zerfließen; zellärmere, die einen größeren Gehalt an Zwischensubstanz aufweisen, zeigen ein derberes Gefüge, manchmal sogar eine sehr harte Konsistenz. Weiterhin kann eine Einlagerung von Knorpel-Knochen- oder Schleimgewebe dem Tumor eine besondere Beschaffenheit verleihen. Aber stets ist das Geschwulstgewebe, das von keiner Knochenschale bedeckt ist, deutlich von dem gesunden Knochen abzutaften. Anders ist es bei den centralen Kiefer-sarkomen, die den Kieferknochen entweder im ganzen verbreitern oder ihn nur an einzelnen Stellen vorwölben. Ist die Knochenschale dick, so fühlt sich die Vorwölbung knochenhart an; bei weiterem Wachstum wird sie nachgiebig, zeigt das bekannte Pergamentknittern. Weiche Stellen deuten auf den nahen Durchbruch des Tumors nach außen.

Nach ihrer Gewebsreife finden wir eine Einteilung der Sarkome in solche mit unvollkomener Gewebsreife, Formen, die nur aus einem dauernd wuchernden Keimgewebe ohne bestimmten Gewebscharakter bestehen. Zu ihnen gehören nach Borst und Herxheimer die Rundzellen-, Spindeldellen- und Riefenzellensarkome, bzw. die aus diesen Zellformen gemischten Sarkome. Neben ihnen finden wir höher entwickelte Formen, bei welchen die Differenzierung, wenn auch noch unvollkommen, so doch so weit vorgeschritten ist, daß die Charaktere bestimmter Arten der Bindestanzgruppe in ihnen erkennbar sind, indem vor allem mehr spezifische

Interzellularsubstanz ausgebildet wird. Auf diese Weise kommt eine Reihe von Geschwülsten zustande, bei denen einer entsprechend homologen Form, eine heterologe, vom Mutterboden mehr abweichende Form, gegenübersteht. Hierher gehören das fibroplastische, myxoplastische, chondroplastische, osteoplastische und angioplastische (Endotheliom) Sarkom; dazu kommen noch die Cylindrome, Pfammome, die Sarkome des lymphoplastischen Gewebes und das melanoplastische Sarkom. Fast alle diese Formen sind am Oberkiefer, bezw. in der Oberkieferhöhle beobachtet worden.

Von den Rundzellen Sarkomen sind die kleinzelligen die bösartigsten, deren Malignität sich in rapidem Wachstum und großer Destruktionsfähigkeit offenbart. Sie bestehen aus kleinen rundlichen Zellen mit spärlichem Protoplasmaleib, der so hinfällig ist, daß man bei frischer Untersuchung fast nur freie Kerne findet. So gleichen diese Sarkome in ihrem Aufbau oft dem einfachen Granulationsgewebe. Die weniger malignen grobzelligen Rundzellen Sarkome zeigen manchmal epithelähnliche Parenchymzellen, die nesterartig in den Hohlräumen des Stromas liegen. Die Tumoren zeigen eine weiße oder rötliche Farbe, sind von weicher, markiger Konsistenz und bilden entweder Knoten oder verursachen eine diffuse Anschwellung.

Die Spindelzellen Sarkome zeigen eine etwas festere Konsistenz und bilden in der Regel mehr circumscripte Knoten. Bei ihnen zeigen die grobzelligeren Formen maligneren Charakter, während die kleinzelligen Formen relativ gutartig sind, doch kommen auch bei ihnen Recidive vor. Der Tumor besteht aus einem dicht verflochtenen Gewebe aus Spindelzellen, neben denen die grobzelligen Formen noch rundliche und unregelmäßige, darunter auch sternförmige, mit zahlreichen Ausläufern versehene Zellen aufweisen (Herxheimer).

Riesenzellen Sarkome treten als periostale oder centrale Knochentumoren des Oberkiefers auf. Die vom Periost des Alveolarfortsatzes ausgehenden Riesenzellen Sarkome werden Epuliden genannt. Es sind pilzförmige, ziemlich feste, knollige Geschwülste, die aus den Alveolarfortsätzen hervorstechen. Die Riesenzellen entsprechen dem Osteoblastentypus; sie sind in Grundgewebe eingelagert, welches zur Hauptsache aus Spindelzellen besteht neben mehr oder weniger entwickelter Interzellularsubstanz. Die Riesenzellen Sarkome des Kiefers sind mehr oder weniger gutartige Geschwülste, die bisweilen

zu ausgesprochener fibröser Umwandlung neigen. Infiltratives Wachstum oder Metastasen sind nie, Recidive sehr selten beobachtet. Nach neueren Arbeiten ist das Riefenzellsarkom der Kiefer keine echte autochtone Geschwulst, sondern eine entzündliche Neubildung (Häupl). Die dem Zahnfleisch mit schmaler Basis oder gestielt aufsitzenden peripheren Tumoren bestehen aus spindelzelligem Gewebe, das sich aus Granulationen entwickelt und in zellarmes Narbengewebe übergeht. Auch bei den myelogenen Riefenzellsarkomen entsteht das Spindelzellgewebe durch reaktive, callöse, luxurierende und resorptive Granulationsgewebsbildungen. Auch Ruf kommt auf Grund seiner histologischen Untersuchungen zu dem Ergebnis, die Riefenzellsarkome im Bereich der Kiefer nicht als autochtone Geschwülste, sondern als entzündliche Gewebsbildungen anzusehen. Dafür sprechen unter anderem die fehlende Polimorphie an den Spindelzellen und besonders das Verhalten der Riefenzellen, deren Entstehung als abortive Gefäßsprossenbildung deutlich nachweisbar ist.

Das fibroplastische Sarkom steht in der Mitte zwischen Fibrom und Sarkom. Makroskopisch gleicht es den Fibromen und kann auch wie diese abgekapselt sein. Mikroskopisch unterscheidet es sich vom Fibrom durch größeren Zellreichtum und ist faserärmer als dieses. Hauptausgangsstelle für das Fibrosarkom der Kiefer ist das Periost. Die Geschwulst ist relativ gutartig.

Eine seltene Geschwulst des Oberkiefers bildet das Myxosarkom, dessen Ursprung einmal in der Kieferhöhle nachgewiesen wurde (Viennois). Robert Monod berichtet über ein Myxosarkom des Oberkiefers bei einem 23-jährigen Patienten, Chirurgie S. 4: Es unterscheidet sich vom Myxom durch seinen Zellreichtum und Unregelmäßigkeiten in der Schleimbildung. In den schleimigen Gebieten findet man bisweilen sternförmig verästelte Zellen, daher auch die Bezeichnung Sternzellen- oder Netzzellsarkom. Das Myxosarkom ist sehr gefäßreich, hämorrhagisch und wird daher leicht mit Polypen verwechselt; es zeichnet sich aus durch sehr rasches Wachstum und Metastasierung.

Die Chondrosarkome gehen gewöhnlich vom Knochen aus und sind umfangreiche Gewächse, die ein hyalinknorpeliges Gewebe produzieren. Daneben finden sich auch cystische Erweichungen. Die Tumoren zeigen ein destruierendes

Wachstum und setzen Metastasen. Loiq berichtet über ein Chondrosarkom, das den ganzen harten Gaumen ergriffen hatte. Wird von den Geschwulstzellen Knochensubstanz gebildet, so entsteht das Osteosarkom; das knochenartige Gewebe tritt dabei in Form von zierlichen Bälkchen, Plättchen und feinspongiösen Ablagerungen auf (Borst).

Geschwülste, deren Mutterzellen die Gefäßwandzellen, nämlich Endothelien und Perithelien (also Angioblasten) sind, bezeichnet man nach Borst am besten als angioblastische Sarkome oder sarkomatöse Angiome. In einer solchen Geschwulst kommen die Charaktere des normalen Blut- und Lymphgefäßgewebes mehr oder weniger deutlich, natürlich geschwulstmäßig verzerrt, zum Ausdruck. Diese angioplastischen Sarkome werden auch **Endotheliome** oder **Peritheliome** genannt und man unterscheidet unter ihnen Lymphangioendotheliome und Hämangioendotheliome. Unter den letzteren trennt man noch die von den Endothelien der Blutgefäße ausgehenden Hämangioendotheliome im engeren Sinne von den Peritheliomen, die von den Perithelien der Blutgefäße ihren Ursprung nehmen. Die typischen Formen des Lymphangioendothelioms sind meist gut abgegrenzte, oft sogar abgekapselte Knoten oder knollige Gewächse; diese sind solid, von ziemlich fester Konsistenz, gelegentlich mehr schleimig oder gallertig. Die Hämangioendotheliome und Peritheliome sind nach Borst blutreiche, schwammige, weiche Neoplasmen. Klinisch handelt es sich bei den reinen Formen um relativ gutartige, wenn auch örtlich destruierende und hartnäckig recidivierende Formen; daneben kommen aber auch bösartige, infiltrierende und metastasierende Geschwülste vor. Im Bereich des Oberkiefers findet man die Endotheliome vor allem als Tumoren des Gaumens und besonders maligne Formen in der Kieferhöhle.

Das Cylindrom ist nach Borst eine gallertartige Geschwulst, die als charakteristischen Bestandteil Kugeln, Kolben, Keulen und Cylinder in einer durchsichtigen hyalin-schleimigen Substanz hervorbringt. Eine einheitliche Geschwulstform stellt das Cylindrom nicht dar; manche Sarkome, Carcinome und Adenome können durch massige Bildung von Schleim, Hyalin, Kolloid einen cylindromatösen Charakter zeigen.

Geschwülste, die Verkalkungen zeigen, werden auch Pflammome genannt. Sie bilden ebenfalls keine einheitliche Geschwulstform, sondern treten als pflammöse Sarkome, Carci-

nome und Endotheliome in Erscheinung. Diese Verkalkungen treten im Bindegewebe als Nadeln, Stacheln, Spieße, Splitter, Balken auf und sind manchmal so ausgedehnt, daß man in den Mäßen eines bindegewebigen Stromas nichts anderes als zahllose geschichtete Sandkörperchen vorfindet.

Im Bereich des harten Gaumens findet man, wenn auch selten, die sogenannten Melanofarkome oder maligne Melanome. Patterfon, Berak und Kutznekow berichten über je einen Fall von Melanofarkom. Die Geschwulst hat durch ihren Gehalt an melanotischem Pigment, das von dem Geschwulstparenchym gebildet wird, eine braune, rauchgraue bis schwarze Farbe, welche aber nur in einem Teil des Tumors ausgesprochen zu sein braucht. Von höchst bösartigem Charakter zeigen die Tumoren rapides Wachstum, wie frühzeitiges Einbrechen in die Blutbahn und reichliche Metastafenbildung. Zur Hauptsache bestehen sie aus großen, rundlichen oder spindeligen, zum Teil auch verzweigten Zellen, welche wenigstens teilweise das charakteristische Pigment in sich aufgespeichert haben; auch das Stroma enthält mehr oder weniger reichlich Melanin.

Während die Carcinome und Sarkome in anderen Körperregionen sowohl auf dem Blut- wie auf dem Lymphwege durch Verschleppung von Geschwulstzellen Metastafen setzen, kommt es bei den malignen Oberkiefertumoren relativ selten zur Bildung von Tochtergeschwülsten. Ueber Allgemeinmetastafen fand ich keine Berichte. Beobachtet werden Schwellungen der Lymphdrüsen, denen die Lymphe der Oberkieferschleimhaut und der Kieferhöhle zufließt. Als Hauptabflußgebiete kommen in Betracht die submaxillaren Lymphdrüsen, von diesen liegt die Gl. mandibularis ant. am vorderen Winkel des Submaxillardreiecks, die Gl. submandibularis med. am Kieerrande median von der Art. maxill. ext., die Gl. mandibularis posterior lateral von der vorhergehenden und meist lateral von der Vena facial. ant. Ein anderer Abfluß erfolgt zu den retropharyngealen Drüsen, bei denen Most eine laterale und mediane Gruppe unterscheidet. Die laterale Gruppe, die beim Kinde immer vorhanden ist, beim Erwachsenen auf einer Seite fehlen kann, ist median von der Carotis interna gelegen und vom Munde aus gesehen dicht unterhalb des weichen Gaumens nahe dem Arcus palatopharyngeus zu suchen. Bei Anschwellung dieser Drüsen wölbt sich die hintere Pharynxwand dicht neben

der Gaumentonsille als rundlicher Tumor vor. Die abführenden Lymphstämme führen von den retropharyngealen Drüsen zu den tiefen Halsdrüsen; manche Lymphgefäße führen auch direkt vom Kiefer unter Umgehung der retropharyngealen Drüsen zu den tiefen Drüsen der Vena jugularis. Auch die submentalen und die im unteren Parotiszipfel gelegenen Drüsen können bei Oberkiefertumoren mitergriffen sein.

Gewöhnlich führen die Carcinome schneller zum Tode als die Sarkome. Ich bringe eine Zusammenstellung aus dem Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde von Denker-Kahler, wonach nach Perthes und Martens die Oberkiefersarkome eine Dauer von 1 Monat bis zu 4 Jahren, durchschnittlich von 14 Monaten haben. Birnbaum berechnet für die Rundzellensarkome 3 Monate, für die perioštalen Riefenzellensarkome 6 Monate, für die Spindelzellensarkome 14 Monate und für die centralen Riefenzellensarkome $4\frac{1}{2}$ Jahre.

Leider kommen die malignen Oberkiefertumoren in ihrem Initialstadium nur selten zur Beobachtung, da sie im Anfang dem Patienten gar keine oder nur sehr geringe Beschwerden machen. Das ist um so trauriger, als mit der längeren Wachstumsdauer eines Tumors die Aussicht auf Heilung durch radikale chirurgische Therapie sehr schnell abnimmt. Es ist daher unbedingt nötig, möglichst frühzeitig die Diagnose auf eine maligne Neubildung zu stellen. Die Erkenntnis der primären, im Sinus maxillaris auftretenden Tumoren bietet dabei viel mehr Schwierigkeiten, als diejenige der sekundären aus der Umgebung in die Kieferhöhle einwachsenden Geschwülste. So können kleine, verdächtige Granulationen im mittleren oder oberen Nasengang als erstes Symptom eines dahinterliegenden, ausgedehnten Gewächses auftreten. Verdächtig sind sie vor allem, wenn sie neben profuser Blutung immer wieder auf eine gründliche Entfernung hin Recidive zeigen. Ist auch bei chronischen Nebenhöhleneiterungen eine solche Recidivneigung beobachtet, so soll zur Differentialdiagnose immer eine histologische Untersuchung der entnommenen Gewebspartien vorgenommen werden. Wenn häufig ohne Schmerzhaftigkeit einhergehend, können manche Geschwülste dennoch den Schmerz als erstes Symptom zeigen. Dabei ist die Art der Schmerzen nicht charakteristisch. Manchmal findet man einen mehr neuralgischen, manchmal einen andauernd dumpfen

Schmerz, wie bei Entzündung der Nebenhöhlen, hervorgerufen durch den Druck des Tumors auf die Wände der Höhlen. Bleiben diese Schmerzen nach Freilegung der Öffnen und der Zuführungsgänge auch nach Ausspülung bestehen, so muß dadurch der Verdacht auf ein Neoplasma entstehen. Nicht selten findet man in vorgeschrittenen Stadien ein Eindringen der Geschwulst in das Endokranium und eine Durchbrechung der Dura. Dabei kommt es zu starken Schmerzen infolge von *circumscrip*ter Meningitis, die durch die Invasion von pathogenen Mikroorganismen aus den oberen Luftwegen in den eröffneten Subarachnoidalraum bedingt werden. Eine durch die Granulationen bedingte Verstopfung der Nase ohne gleichzeitigen Schnupfen ist häufig ein Symptom, das den Kranken zum Arzt führt. Daneben tritt Nasenverstopfung auf durch Verdrängung des Septums von Tumoren der entgegengesetzten Seite, die nicht selten später die Nasenscheidewand durchbrechen und in die andere Nasenhöhle hineinwuchern.

Spontanblutungen kommen nach Ansicht vieler Rhinologen bei Carcinomen seltener vor als bei Sarkomen. Der Grund dazu liegt wohl in der Gefäßarmut des Carcinoms gegenüber dem Gefäßreichtum des Sarkoms; doch zeigen beide Geschwulstformen schon bei leichter Berührung und Sondierung, vor allem auch bei größeren Eingriffen die Neigung zu heftigen Haemorrhagien. Während nach Holmgren sanguinolentes, dünnflüssiges Sekret mehr für Papillom und Sarkom spricht, kennzeichnet übelriechender, eitrigter Ausfluß meist ein Carcinom. Der Foetor ist dabei die Folge der jauchigen Zersetzung der zerfallenen Tumormassen und pflegt gerade bei großen, erweichten Carcinomen der Kieferhöhle äußerst penetrant zu sein.

Zu Gestaltsveränderungen des Gesichtskelettes kommt es meist erst dann, wenn die Geschwulst eine beträchtliche Größe erreicht hat. Bei Lokalisation in der Kieferhöhle entsteht die charakteristische Auftreibung der Wangengegend, in deren Haut sich oftmals Venektasien entwickeln. Zu gleicher Zeit läßt sich oft eine Vorbuchtung der medialen Kieferhöhlenwand gegen die Nasenhöhle oder in seltenen Fällen eine Vorwölbung des Kieferhöhlenbodens gegen die Mundhöhle feststellen. Bei den Kieferhöhlengeschwülsten bricht der Tumor bisweilen in den Alveolarfortsatz ein und es kommt dann zur Lockerung der entsprechenden Zähne, Dislokation und Zahnschmerzen. Es kann außerdem noch ein Durch-

bruch durch die hintere Kieferhöhlenwand in die Fossa retromaxillaris erfolgen, die von Kieferklemme begleitet sein kann.

Die Geschwülste der Oberkieferhöhlen brechen sehr leicht auch durch den dünnen Boden der Augenhöhle und führen infolge der Erscheinung am Auge den Patienten oft zuerst zum Augenarzt. Bei der Wichtigkeit einer frühzeitigen Diagnose der sich rasch ausbreitenden Neubildung ist bei allen Läsionen des N. opticus, der Augenmuskelnerven, bei allen Verlagerungen des Augapfels, Störungen der Pupillenreaktion, bei den geringsten Veränderungen des Gesichtsfeldes eine genaue Untersuchung der Gesichtshöhlen geboten. Meist ausgehend vom Perioßt des Daches der Oberkieferhöhle dringt der Tumor sehr bald in die Augenhöhle vor, so daß die Augensymptome meist denen der Behinderung der Nasenatmung vorausgehen. Dann erst breitet sich die Geschwulst in der Nasenhöhle, Gaumenhöhle, den Siebbeinzellen aus, um dann auch auf die andere Seite überzugreifen.

Leguini teilt die Augensymptome zweckmäßig in 2 Gruppen ein; die eine die Symptome des gleichseitigen Auges und seiner Adnexe umfassend, die zweite jene, die die Nasenatmung und den Sehnerv der Gegenseite betreffen. An der Hand von 5 beobachteten Fällen stellt er als Symptome zusammen:

1. auf der Seite des Tumorsitzes,

- a) Doppelsehen,
- b) Beschränkung der Augenbewegungen und gleichzeitig
- c) Störung des Spinkter Iridis.
Die ophtalmoskopischen Veränderungen hängen ab vom Sitz in der vorderen oder hinteren Augenhöhle. Sie äußern sich als
- d) Hyperaemie des Sehnerven,
- e) Neuritis optica,
- f) als Stauungspapille oder
- g) als Atrophie.
Hand in Hand damit gehen
- h) Störung des Gesichtsfeldes, die besonders bedeutungsvoll in jenen Fällen sind, die noch keinen Augenspiegelbefund ergeben. Als letztes Symptom gehört zu dieser Gruppe

- i) der Exophthalmus, dessen Ursprung seine Unverrückbarkeit auf Fingerdruck, die gleichzeitige Deviation und andere Veränderungen, wie Chemose verraten.
- 2. In der zweiten Gruppe sind ophthalmoskopische Veränderungen nicht immer wahrnehmbar; um so wichtiger sind die des Gesichtsfeldes, ganz besonders
 - a) die Vergrößerung des blinden Fleckens unter Umständen verbunden mit
 - b) einem centralen Skotom, die den Ergebnissen der Augenspiegel-Untersuchung, Diaphanoskopie, Radiographie und Rhinoskopie vorauseilen. Sie zeigen eine Kompression des Sehnerven im Niveau des canalis opticus an, sei es, daß er von der Geschwulst selbst ergriffen ist, sei es daß er durch die Wandung des Kanals komprimiert wird.

Die Symptome der zweiten Gruppe ergeben eine für das Leben ungünstige Prognose und sprechen gegen jeden Eingriff, während die der ersten je nach ihrer Schwere und Ausdehnung einen Fingerzeig abgeben für den Nutzen eines operativen Einschreitens und für dessen Gestaltung.

Nicht selten gewinnen die Kieferhöhlenneubildungen auch einen Einfluß auf den Tränenapparat. Nach der Durchbrechung der knöchernen Wandung des Ductus nasolakrymalis kann es durch Kompression des häutigen Kanals oder durch Verlegung des Ostiums im unteren Nasengang zu einer Abflußhinderung in die Nase und zu Tränenträufeln kommen.

Störungen des Allgemeinbefindens werden oft bei den malignen Oberkiefertumoren vermißt. Wenn der Tumor bei seinem weiteren Wachstum nicht gerade den Gaumen zerstört oder eine Lähmung der Schlund- und Zungenerven herbeiführt, ist die Nahrungsaufnahme nur wenig beeinträchtigt. Durch Verschlucken von jauchigem Sekret können Magenbeschwerden auftreten.¹⁾ Meistens kommt es nicht zu kachektischen Erscheinungen, da der Patient vorher meist durch schwere Blutungen, intrakranielle Komplikationen oder durch eine Pneumonie zugrunde geht.

Nach Aufnahme einer möglichst genauen Anamnese, die uns mit den Beschwerden des Kranken bekannt macht, soll zunächst eine genaue Inspektion und Palpation des Gesichtes den Weg zu einer sicheren Diagnose einleiten. Dabei können

Formveränderungen, wie die schon genannte Auftreibung der Wangengegend mit Venektasien, Exophthalmus und Beschränkung der Augenbewegung, Oedeme der Augenlider oder eine Verlegung der Nase einen Verdacht auf einen vorhandenen Tumor stützen. Zu beachten ist dabei vor allem das Pergamentknittern der faciaen Oberkieferwand, hervorgerufen durch Verdünnung des Knochens infolge einer Druckfurur oder cariöser Zerstörung durch eine Geschwulst. Schwellungszustände der Wangengegend können auch durch eine chronische Periostitis verursacht sein. Meist sind cariöse Zähne die Ursache dieser Krankheit, die neben der Schwellung akut entzündliche Erscheinungen, Schmerzhaftigkeit und Temperatursteigerung zeigt. Während die Tumoren häufig auch eine Vorwölbung nach dem Gaumen hin zeigen, fehlt diese bei der Periostitis. Unter den chronischen Knochenhautentzündungen kommen außerdem noch eine gummöse Periostitis oder ein tuberculöser Prozeß in Frage. Letzterer neigt bei längerem Bestehen zu Fistelbildung oder Abstoßung eines Sequesters. Eineluetische Affektion muß durch Anamnese, genaue Inspektion von Nase und Knochen auf Narben, sorgfältige Untersuchung des ganzen Körpers des Patienten, eine negative Wassermann'sche Reaktion, eventuell durch eine probeweise antiluetische Kur ausgeschlossen werden. Auch ein Empyem der Oberkieferhöhle kann differential-diagnostisch in Frage kommen. Es wird nur bei vollständigem Verschuß der Oberkieferhöhle und Fehlen einer accessorischen Öffnung Auftreibung oder Zerstörung der faciaen Wand hervorrufen. Meist kommt es zu einem Durchbruch in der Fontanellengegend, als der Stelle des geringsten Widerstandes. Die Leontiasis faciei, auf eine Seite des Gesichtes beschränkt, kann ebenfalls zu Verwechselungen führen. Sie breitet sich aber meist diffus aus und erstreckt sich gewöhnlich über sämtliche Gesichts- und Schädelknochen.

Eine Schwellung der Oberkiefergegend bei Osteomyelitis, die sehr selten ist, zeigt durch Störung des Allgemeinbefindens und durch ihren fieberhaften Verlauf einen deutlichen Unterschied gegenüber einer malignen Neubildung. Noch seltener ist die Aktinomykose des Oberkiefers mit einer harten Wangeninfiltration. Der mikroskopische Nachweis von Strahlenpilzen im Eiter stellt die Diagnose sicher.

Ganz ähnliche Erscheinungen wie eine maligne Geschwulst der Kieferhöhle macht eine Zahn- oder Kiefercyste. Auch sie geht einher mit Schwellung in der Wangengegend, Pergamentknittern und Schmerzen geringen Grades. Daneben

findet man häufig Fluktuation oder Pseudofluktuation in der Gegend der Fossa canina. Eine Punktion der Fossa canina auf cystischen Inhalt der Geschwulst, eine genaue Untersuchung des Hiatus semilunaris auf Entzündungs- oder Tumorprodukte, eventuell eine Probeexcision von sich vorwölbendem Gewebe kann die Diagnose klären.

Die Feststellung eines ulcerierten Carcinoms, wie es vor allem am Alveolarfortsatz des Oberkiefers auftritt, ist gewöhnlich leichter durch die charakteristische Beschaffenheit des Geschwürs. Es zeigt einen wallartig aufgeworfenen harten Rand um einen schmierig-jauchigen Grund von warziger oder höckeriger Beschaffenheit. Ähnliche Erscheinungen kann aber auch ein Dekubitalgeschwür zeigen. Wenn auch seine ebenfalls scharfen Ränder meist weniger infiltriert sind, so läßt der graubelegte, leicht blutende Geschwürsgrund häufig an ein ulceriertes Carcinom denken, zumal das Dekubitalgeschwür meist in der Einzahl vorkommt. Wenn es nach Beiseitigung seiner vermeintlichen Ursache, sei es ein abnormer Zahn oder eine schlecht sitzende Prothese in einigen Tagen nicht ausheilt, soll es als krebverdächtig gelten. Eine fehlende Lymphdrüsenanschwellung spricht nicht gegen ein Carcinom.

Viele oberflächliche, geschwürige Mundhöhlenkrebse gehen aus der Leukoplakie hervor; daher ist ihr besonders sorgfältige Beobachtung zu schenken. Die Grenze der Bösartigkeit zwischen einem leukoplakischen Ulcus und einem aus ihm sich entwickelnden Carcinom ist kaum festzustellen, doch deuten stärkere Schmerzen auf eine maligne Entartung. Die Leukoplakie selbst ist nur bei direkter Verletzung, z. B. beim Essen und bei Abreißen kleiner Hautschuppen leicht schmerzhaft. Jedes tiefergehende Ulcus ist sofort als carcinomverdächtig zu excidieren und genauestens zu untersuchen. (Pichler). Die Verwechslung von Krebsgeschwüren mit ulcerösen Prozessen bei Syphilis und Tuberculose dürfte bei genauer Untersuchung nicht schwer fallen, da diese Ulcera ganz spezifische typische Formen aufweisen. Eine Untersuchung auf die spezifischen Erreger dürfte dazu unerlässlich sein.

Ein weiteres Hilfsmittel zur Diagnosestellung bietet die rhinoskopische Untersuchung des Naseninnern, die uns vor allem wichtige Hinweise auf einen Kieferhöhlentumor bieten kann. Schwierigkeiten ergeben sich, wenn der Tumor bereits weit in das Naseninnere vorgedrungen ist oder eine Schwellung des vorderen Teiles der mittleren Muschel einen Einblick verwehrt. In diesem Falle muß nach Cocainisieren

aufs sorgfältigste unter Anwendung der Rhinoskopia ant. post. und media untersucht werden. In anderen Fällen weisen graurote, granulationsähnliche Bildungen im mittleren Nasengang auf ein Kieferhöhlencarcinom. Sie bluten stark bei Berührung und Abtragung und können das Bild eines Nasenpolypen vortäuschen. Oft unterscheiden sie sich von diesem nur durch derbe Konsistenz und eine andere Farbe. Die Carcinome haben meist eine graurote Verfärbung, während die Fibrosarkome und Spindelzellensarkome blaßrosa sind. Die Rundzellensarkome haben eine intensiv rote oder blaurote Farbe; die Melanosarkome sind dunkelrot bis schwarz gefärbt. Im Zweifelsfalle soll die histologische Untersuchung eines excidierten Gewebstückes die Diagnose unterstützen. In den meisten Fällen gibt das Mikroskop Aufschluß über den Charakter der Geschwülste, so vor allem bei Carcinom und vollentwickeltem Sarkom. Bei Berücksichtigung des ganzen Geschwulstaufbaues, nach dem Verhalten der Zellen und Gefäße, sowie der Intercellularsubstanz dürfte die Diagnose der Art und Malignität des Tumors nicht schwierig sein. Andererseits können frühe Entwicklungstadien, vor allem der Sarkome, häufig eine Unterscheidung zwischen Neoplasma oder entzündlicher Neubildung nicht leicht machen, ja sogar unmöglich sein. Die Probeexcision ist mit Vorsicht anzuwenden. Viele Autoren (Perthes, Wintz, Haudeck, Heynemann, Zweifel, Payer, Haberlandt, Sadvig) stehen auf dem Standpunkt, daß dieser Eingriff ein rapides Wachstum des Tumors nach sich ziehe. Siegel, Hohlfelder, Colmers sehen in ihr vor allem eine Trübung der Prognose für die nachfolgende Strahlenbehandlung. Aschoff fürchtet für eine künstliche Bildung von Metastasen. Da aber eine Probeexcision zur Sicherung der Diagnose häufig unumgänglich ist, soll die nachfolgende histologische Untersuchung möglichst beschleunigt werden (nach Eißelsberg Herstellung von Gefrierschnitten), so daß gegebenenfalls gleich die Radikaloperation angeschlossen werden kann.

Bei Kieferhöhlencarcinomen ist manchmal eine probatorische Eröffnung der Höhle zur Klarlegung der Diagnose nötig; so in Fällen, wo außer einer Eiterabsonderung durch die Nase nur geringe klinische Symptome bestehen.

Die Diaphanoskopie, die nicht sehr zuverlässig ist, hat in neuerer Zeit der Röntgenphotographie als diagnostischem Hilfsmittel Platz gemacht. Das Röntgenbild gibt uns Aufschluß über Größe und Ausbreitung des Tumors, zeigt auch

bei geeigneter Aufnahme-richtung Durchbrüche von Neoplasmen durch die Knochenwand. Link vermag aus dem Röntgenbild die Gewebsstruktur verschiedener Tumoren zu erkennen. Nach ihm sind Cylindrome charakteristisch durch die wabige Struktur des Knochenschattens, Plasmome durch einen marmorierten, flockigen, grobgekörnerten, zarten Schatten. Osteome sollen einen dicken, kompakten, wulstigen, scharf conturierten Schatten aufweisen. Bei den Plasmomen ist es die eigenartige Verteilung von Kalkkonkrementen, welche die kennzeichnende Beschaffenheit des Röntgenschatteus bewirkt.

Muck empfiehlt als diagnostische Methode die Auscultation der Kieferhöhle. Man setzt den mit einem Auscultationschlauch verbundenen Ohrtrichter in die Fossa canina auf die faciale Wand der Kieferhöhle. Bei lufthaltiger Höhle vernimmt man ein amphorisches Geräusch. Ist die Schleimhaut verdickt, oder die Höhle mit einem Tumor ausgefüllt, so wird dieses Geräusch abgeschwächt bzw. es schwindet vollständig. Das Fehlen des Geräusches würde demnach für das Vorhandensein eines Tumors sprechen.

Seit einigen Jahren sucht man auch die Freund-Kaminer'sche Serumreaktion für die Diagnose eines Carcinoms zu verwenden. Dem Serum Carcinomkranker fehlt eine in Aether lösliche, zellzerstörende Säure, die das normale Serum besitzt; außerdem besitzt es ein Nucleoglobulin, das imstande ist, Carcinomzellen gegen normales Serum zu schützen und die den Carcinomzellen zugesetzte, zerstörende, ätherlösliche Säure zu paralisieren. Die von Arzt und Kerl veröffentlichte und das Material der Chiarischen Klinik enthaltende Arbeit: „Ueber die Verwertbarkeit der Freund-Kaminer'sche Reaktion“ ergab bei den Geschwülsten in 83⁰/₁₀₀ der Fälle richtige und in etwa 17⁰/₁₀₀ unrichtige Diagnosen.

Die ins Blut übergehenden Stoffwechselprodukte der Carcinome und Sarkome wirken auslösend auf die Bildung von Abwehrfermenten; nach Abderhalden Fermente, die bei parenteraler Zufuhr von fremdem Eiweiß im Körper entstehen und imstande sind, dieses artfremde oder auch nur plasmafremde Eiweiß abzubauen. Die Abwehrfermente der malignen Tumoren sind spezifisch, d. h. das Serum eines Carcinomkranken vermag nur das Carcinomeiweiß abzubauen, nicht aber das Sarkomeiweiß und umgekehrt. So kann man also in zweifelhaften Fällen, vor allem im Anfangsstadium, wenn eindeutige Tumorsymptome noch nicht festzustellen sind, das Blut des Kranken mit den Abderhaldenschen

Methoden auf Abwehrfermente, Dialysierverfahren und opt. Methode, auf Carcinom oder Sarkom untersuchen. Die Ergebnisse zeigen häufig überraschende Bestätigung eines Verdachtes.

Die Therapie der malignen Tumoren besteht auch heute noch in erster Linie in einer chirurgischen Behandlung. Die in neuester Zeit versuchten chemischen, medikamentösen und immunisierenden Methoden zeigen zu wenig sichere Erfolge. Dagegen versprechen die physikalische Therapie, vor allem die Röntgen-Radiumtherapie, wie auch die Diathermie gute Heilungsaussichten. Diese betreffen insbesondere die Sarkome und zeigen in Kombination mit operativen Eingriffen beachtenswerte Erfolge.

Bei der Röntgenbestrahlung ergeben die Strahlen mit kurzer Wellenlänge die besten therapeutischen Erfolge. Es ist notwendig, eine möglichst große Menge von Strahlen auf den Tumor zu leiten, ohne daß eine Schädigung des umgebenden gefunden Gewebes eintritt. Daher benutzt man heute am besten die sogenannte Vierfelderbestrahlung, bei der sich die wirksame Dosis der Strahlen gerade auf die Geschwulst konzentrieren läßt. Die Röntgen-Radiumstrahlen wirken vor allem auf Zellen, welche sich in Teilung befinden infolge der spezifischen Empfindlichkeit des Chromatins der Zellkerne. Je mehr sich ein Gewebe dem embryonalen und undifferenzierten Zustand nähert, desto strahlenempfindlicher ist es. Da 12–24 Stunden vergehen, bis alle Zellen eines Tumors die Teilung durchgemacht haben, sind mehrere Tage zur Bestrahlung nötig (Brachetto-Brian). Die größte Strahlenempfindlichkeit besitzen die Lymphosarkome, dann die Rundzellen- und Spindelzellensarkome; bei Chondrosarkomen sind Bestrahlungen wirkungslos, die Melanosarkome zeigen ein refraktäres Verhalten.

Bezüglich des Zeitpunktes der Bestrahlung wird von den meisten Autoren eine voroperative Strahlenbehandlung abgelehnt, da es unter dem Einfluß der Röntgenstrahlen zu Gefäßneubildung und Bindegewebswucherung kommt, die das Ausbreitungsgebiet des Tumors verschleiern können, so daß der Operateur häufig gezwungen ist, Gewebsteile in der Umgebung des Tumors unnötigerweise zu opfern. Bei Tumoren, die sich an der Grenze der Operabilität befinden, kann die Strahlenbehandlung nützlich sein, indem sie die Größe des Tumors verkleinert, ihn beweglich macht und die Sekretion oder Ulceration herabsetzt. Ebenso erfahren inoperable

Geschwülste durch die Bestrahlung eine Verminderung ihres Wachstums, Aufhören der Blutung und verursachen dem Patienten weniger Schmerzen. Ganz besonders aber hat sich die Nachbestrahlung nach vorausgegangener Operation bewährt. In manchen Fällen zeigte eine Kombination von Röntgen- und Radiumstrahlen gesteigerten Erfolg.

Das Radium verwendet man heute ausschließlich in Form des gefilterten Radiums bzw. der Radiumsalze. Die früheren Methoden der Injektion minimaler Mengen von Radiumsalzen in den Tumor und Anwendung radioaktiver Salben sind als veraltet abgelehnt. Zur Aufbewahrung der Salze verwendet man entweder Spicknadeln, Glastuben oder Goldkapfeln, oder plast. Apparate bzw. Prothesen, in die das Radium eingeschlossen und durch Bleiplatten so abgedichtet ist, daß nur die erkrankte Stelle getroffen wird. Ueber die Kapfeln werden Silberfilter gestülpt, die je nach Oberflächenbehandlung oder Tiefenbestrahlung von verschiedener Dicke sein können und die weniger wirksamen Alpha- und Betastrahlen auszuschalten vermögen. Alle Apparate müssen gut fixiert sein, da sie meist längere Zeit einwirken sollen.

Nach Hautant sollen große Totaldosen vermieden und die angewandte Dosis (Millicuries) auf 18–20 Bestrahlungsherde verteilt werden. Jede Einzeldose wirkt hinreichend auf die nach der Operation noch vorhandenen Geschwülste ein, ohne die Vitalität der darunter liegenden Knochenoberfläche zu schädigen. Verfasser empfiehlt gleich nach der Operation den Beginn der radioaktiven Bestrahlung und schützt die Wundränder durch Einlegen abgetränkter Gazestreifen. Diese Schutzstreifen und die auf ihnen plazierten Tuben bleiben 4 Tage liegen. Während dieser Zeit steigt die Temperatur langsam an, bisweilen bis $38,5^{\circ}$. Dann werden Streifen und Tuben entfernt und die Mundhöhle ausgespült. In den folgenden Tagen belegen sich die Höhlenwandungen mit weißen oder leicht gelblichen Membranen. Nach Ablauf eines Monates ist die Höhle glatt, gesund und feucht, sondert aber noch ein weißliches Sekret ab, weshalb täglich eine Ausspülung gemacht werden soll. Während der beiden ersten Monate bestehen noch geringe Schmerzen, während sich der Allgemeinzustand aber schon beträchtlich hebt.

Auf Grund langjähriger Erfahrungen an dem Pariser Universitäts-Radium-Institut rät Hautant auch bei inoperablen Fällen zu einem vorherigen chirurgischen Eingriff. Dieser bezweckt:

1. Die möglichst vollständige Entfernung des Tumors sowie die Erkennung all seiner nicht zu operierenden Fortsätze, auf welche man später das Radium einwirken lassen muß.
2. Die Beseitigung aller Infektionsherde, wie sie sich in der Nachbarschaft der Mund- und Nasenhöhle entwickeln; denn ein infizierter Krebs reagiert schlecht auf Radiumbestrahlung. Durch ausgedehnte chirurgische Abtragung werden aber die septischen Herde drainiert, so daß dann die Radiumstrahlen auf Gewebe einwirken, die relativ frei von solchen Infekten sind.
3. Die Vermeidung einer der Radiumbestrahlung leicht folgenden Knochennekrose durch vorherige Refektion der von der Neubildung ergriffenen Knochen (harter Gaumen, Proc. alveolaris, Infra-orbitalrand, Kieferknochen selbst). Erhält man diese Knochen, so hat man ein Rezidiv zu erwarten, falls man sie nicht bestrahlt. Bestrahlt man sie aber hinlänglich, so kommt es eben zur Knochennekrose mit ihren Folgeerscheinungen der Eiterretention und der sekundären Infektion benachbarter Organe. Derartig akut einsetzende Nekrosen werden von unerfahrenen Beobachtern nicht selten mit einem Geschwulstrecidiv verwechselt und von neuem bestrahlt, was natürlich zu traurigen Resultaten führt.

Die ausschließliche Strahlenbehandlung eines Tumors zeigt nach den Erfahrungen Hautants keine befriedigenden Resultate, wenn auch immerhin Heilungen vorkommen. Am besten wirkt noch eine Behandlung mit Radium-Emanation, während die reine Röntgenbestrahlung wenig Erfolg bringt. Die mit kombinierter Röntgen-Radiumtherapie behandelten Fälle zeigen etwas bessere Ausgänge. Immerhin ist die Radiumbehandlung als ein sehr wichtiger Heilfaktor in der Therapie der malignen Geschwülste anzusehen und nimmt nach der chirurgischen Behandlung sicher die erste Stelle ein.

Letztere ist auch heute noch die Methode der Wahl. Die blutige Operation hat erst seit der Erfindung der Kuhn'schen Kehlkopf-Tamponkanüle (perorale Tubage) viel von ihren Gefahren verloren. Die zur Freilegung des Ursprungs- und Ausbreitungsgebietes des Tumors notwendigen Voroperationen verursachen sehr heftige Blutungen, so daß bei einer tiefen Nar-

kose häufig mit einer gefahrbringenden Aspiration und folgender Schluckpneumonie gerechnet werden muß. Zwar suchte Trendlenburg bereits mit einer Präventivtracheotomie dieser vorzubeugen, verhütete auch damit ein Hinabfließen von Operationsmaterial, konnte aber eine sekundäre Lungenkomplikation mit häufigem letalen Ausgang infolge der durch den Luftröhrenschnitt veränderten Atmungsweise nicht verhindern.

Erst die Kuhn'sche Methode schaffte einen sicheren Abschluß der Luftwege gegen herabfließendes Blut und Eiter, ohne die erwähnten Nachteile der Tracheotomie aufzuweisen.

Im allgemeinen hat heute die Inhalationsnarkose der lokalen oder Leitungs-Anaesthesie Platz gemacht, und zwar kann man folgende Arten der Anaesthesierung verwenden:

Zunächst eine Infiltrationsanaesthesie der Weichteile, kombiniert mit der Oberflächenanaesthesie der Nase. Diese genügen für fast sämtliche Nebenhöhlenaffektionen.

Bei größeren Tumoroperationen versucht man eine Querschnittsunterbindung der großen zuführenden Nerven, vor allem des II. Trigeminus (Ramus maxillaris) am for. rotundum.

Bei totaler Oberkieferrektion und bei den Operationen von Parfisch und Kocher kommt die Leitungsunterbrechung des Trigeminus durch Injektion in das Ganglion Gasseri in Frage. Hier muß nach Härtel, der diese Anaesthesierung besonders ausgearbeitet hat, strengste Asepsis beobachtet werden. Bei ulcerativen oder septischen Prozessen in der Nähe der Einführungsstelle der Nadel ist deshalb von dieser Anaesthesierung Abstand zu nehmen.

Kommen Operationen am Siebbein mit in Frage, so ist eine Infiltration des N. ethmoidalis an der Innenwand der Augenhöhle und des N. zygomaticus an der Außenwand der Orbita ratsam. Birkholz gab eine besonders günstig wirkende Leitungsanaesthesie des Nervus maxillaris an, die den Nerv in der Sphenomaxillargrube zu treffen sucht.

Um den starken Blutverlust bei den großen Operationen zu vermeiden, hat man vielfach eine prophylaktische Unterbindung der Carotis, ext. oder int. angeraten. Die letztere zeigt bei längerer Dauer häufig schwere Ausfallerscheinungen im Gehirn, Erweichungsherde infolge Ernährungsstörungen und ist deshalb bald abgestellt worden. Holmgren spricht sich gegen eine Unterbindung der Carotis externa aus, weil sich bis zur Zeit der Nachblutungsgefahr Kollateralen ausgebildet

haben könnten. Um diese Komplikation zu verhindern, empfiehlt König die Unterbindung oberhalb des Abganges der Art. thyreoidea sup. vorzunehmen. Viele Chirurgen verzichten ganz auf die prophylaktische Gefäßunterbindung und ersetzen sie durch eine Umspritzung des Operationsgebietes mit einer 1⁰/₁₀igen Novocain-Suprareninlösung. Diese führt zu einer Kontraktion der Gefäße, damit zu starker Anaemie, die die Blutungsgefahr wesentlich herabsetzt.

Für die chirurgische Entfernung der malignen Oberkiefer Tumoren kommt neben der partiellen Resektion nur noch die totale Oberkieferexstirpation in Frage. Bei Kieferhöhlengeschwülsten empfiehlt sich vor allem die permaxilläre Methode nach Denker:

„Der durch Schleimhaut und Perioßt bis auf den Knochen durchdringende Weichteilschnitt verläuft, über dem Weisheitszahn beginnend, in der Umschlagsfalte der Oberlippe zum Alveolarfortsatz parallel, durchschneidet das Frenulum labii sup. und erstreckt sich in gleicher Richtung noch 2–3 cm auf die andere Seite hinüber. Mit dem Raspatorium werden nun die Weichteile soweit nach oben geschoben und durch zwei scharfe, vierzinkige Haken gehalten; daß nicht nur die faciale Wand des Oberkiefers und die Apertura piriformis, sondern auch der untere Orbitarand und die entsprechende Partie des Stirnfortsatzes des Oberkiefers freiliegt. Um die Weichteile so weit noch oben herauf zu ziehen, wird es notwendig, die Schleimhaut an der unteren Umrandung der Apertura piriformis vom knöchernen Nasenboden abzuhebeln und der lateralen Nasenwand abzutrennen. Nur so kann man nachher die Siebbeingegend frei aufdecken. Der unter dem Orbitarand aus seinem Kanal austretende N. infraorbitalis wird nun nach oben hinaufgezogen. Ist die mediale Kieferhöhlenwand durch den Tumor nicht zerstört, so wird vor der Eröffnung der Kieferhöhle von dem lateralen Rand der apertura piriformis aus die Schleimhaut der lat. Wand des unteren und des mittleren Nasenganges mit einem flachen, an seinem Ende stumpfwinklig abgebogenen Elevatorium abgehoben; diese Ablösung erstreckt sich nach hinten bis zur hinteren Kieferhöhlenwand. Die untere Muschel wird nun mit einer kräftigen Nasenschere an der Crista turbinalis abgetrennt, und dann zur Stillung der Blutung zwischen die abgelöste Mucosa und den Knochen ein mit Cocain-Suprarenin getränkter Gazestreifen eingeführt. Um eine vorzeitige Blu-

tung in die Kiefer- und Nasenhöhle zu verhüten, wird die Fortnahme der faciafen Oberkieferwand einschließlich des unteren Teiles des proc. frontalis unter Schonung der darunterliegenden Schleimhaut mit Meißel und flacher Knochenzange vorgenommen. Excidiert man nun die Schleimhaut, so kann die Blutung durch Tamponade gut beherrscht werden.

Alsdann wird die knöcherne lat. Nasenwand einschließlich der Crista piriformis mit Luerscher Zange und Meißel, soweit sie noch steht, reseziert. Die Geschwulst liegt nun, falls sie unter Zerstörung der med. Kieferwand die Nasen- und Kieferhöhle einnimmt, frei vor, und kann excidiert werden. Ist der Eingriff in lokaler Infiltrationsanästhesie ausgeführt, so ist es zweckmäßig, dem Herabfließen von Blut durch Einführung eines festen Tampons in den Nasenrachenraum vorzubeugen. Bei dem weiteren Vorgehen soll man möglichst schnell operieren; da alle festeren Knochenteile vorher entfernt worden sind, gelingt es leicht, die ganze Kiefer- und Nasenhöhle unter evtl. vollständiger Refektion des Siebbeins mit großen Löffeln, Conchotomen und dem Finger auszuräumen. Mit Leichtigkeit läßt sich in der Tiefe die vordere Wand der Keilbeinhöhle resezieren und so Kieferhöhle, Nasenhöhle und Keilbeinhöhle in einen einheitlichen großen Raum verwandeln. Durch die Choane schaut man in den Nasenrachenraum hinein und es lassen sich, wenn man den hinteren Teil des Vomer reseziert, auch Tumormassen, die bis hierhin vorgedrungen sind, gründlich excidieren. Nach sorgfältiger Entfernung aller suspekter Weichteil- und Knochenpartien wird die ganze Wundhöhle mit Jodoformgaze tamponiert und die orale Wunde primär vernäht. Die Nachbehandlung, kombiniert mit Radiumbestrahlung, erfolgt nach Entfernung des Tampons vom Naseneingang aus.“

Eine Kontinuitätstrennung der äußeren Haut findet bei der Denker'schen Operation nicht statt. Da auch durch die dauernde Fortnahme der Skeletteile durchaus keine Entstellung der Gesichtes bewirkt wird, so ist das kosmetische Resultat nahezu ideal. Der Blutverlust ist relativ gering, vor allem gegenüber der oralen Methode von Parfisch und Kocher.

Indiciert ist das Denker'sche Verfahren bei allen Tumoren der Oberkieferhöhle und ihrer Umgebung mit Ausnahme der Fälle, bei denen der Alveolarfortsatz bzw. der Boden

der Kiefer- oder Nasenhöhle mitergriffen ist; in diesen Fällen kommt die totale Oberkieferresektion in Betracht.

Kocher sucht durch die intermaxilläre Methode, d. h. durch Auseinanderklappen des horizontalen Teils beider Oberkiefer in die Tiefe der Nase an das Nasenrachendach und den Boden der Kieferhöhle vorzudringen. Er spaltet die Oberlippe durch einen vom Nasenloch nach abwärts verlaufenden senkrechten Schnitt und durchschneidet alsdann die Umschlagstelle der Oberlippe bis auf den Knochen. Entsprechend diesem Schnitt wird nun mit breitem Meißel die Verbindung des Alveolarfortsatzes und des harten Gaumens mit der facialis und der medialen Kieferhöhlenwand durchschlagen. Wenn man dann in der Medianlinie den harten Gaumen und die Alveolarfortsätze zwischen den beiden oberen Schneidezähnen mit dem Meißel oder der Giglißäge durchtrennt, so lassen sich die beiden horizontalen Hälften des Oberkiefers mit kräftigem Zuge aneinanderklappen und man erhält einen guten Einblick in die Nasenhöhle und in den Nasenrachenraum und kann hier vorhandene Tumormassen ausräumen.

Für die totale Oberkieferresektion sind eine große Anzahl von Methoden angegeben, die sich durch eine verschiedene Führung des Weichteilschnittes unterscheiden. Am besten ist der von Kocher modifizierte Hautschnitt nach Diefenbach-Weber. Der Schnitt beginnt innerhalb des inneren Augenwinkels, verläuft an der Grenze zwischen Nase und Wange nach abwärts, umkreist den Nasenflügel bis zur Mitte und spaltet die Oberlippe in der Medianlinie. Von dem oberen Ende des Schnittes wird alsdann nach außen an dem unteren Orbitalrand entlang ein querverlaufender Schnitt geführt, der in seinem äußeren Teil nach dem Vorschlage Kochers zur Schonung des Augenastes des N. facialis schräg nach abwärts verläuft. Durchtrennt man nun im Munde die Schleimhaut in der Umschlagsfalte der Wange zur Gingiva, so läßt sich der so gebildete Weichteillappen von den darunterliegenden Knochen leicht abheben und die ganze faciale Wand des Oberkiefers freilegen. Bevor an die Lostrennung des Knochens herangetreten wird, muß das Periost am Boden der Orbita bis zur Fissura orbitalis inferior zurückgeschoben und der Bulbus mit einem flachen Haken nach oben geschoben werden. Alsdann wird der Oberkiefer aus seinen Verbindungen mit dem Jochbein, Nasenbein und der Gaumenplatte und zum Schluß dem Flügelfortsatz des Keilbeins durch Säge, Meißel

ufw. losgelöst. Um die in diesem Moment entstehende heftige Blutung aus den Ästen der Art. max. int. zu unterdrücken, wird ein Jodoformgazetampon fest in die Wundhöhle hineingedrückt; nach einiger Zeit lassen sich meist einige Äeste der Art. max. oder diese selbst fassen und unterbinden.

Auf das sorgfältigste muß nun die große Wundhöhle besonders in der Richtung nach der Schädelbasis, der Flügelgaumengrube und der Orbita zu auf etwaige Tumorreste abgesehen werden; alles Verdächtige wird radikal entfernt. Ist der Orbitainhalt mitergriffen, so muß der Bulbus, zusammen mit den umgebenden Weichteilen, exenteriert werden.

Bei der Nahtversorgung der Operationswunde kommt es vor allem darauf an, einen Abschluß zwischen der Mundhöhle und der Nasenhöhle herzustellen. Ist die Geschwulst nicht durch den harten Gaumen durchgewachsen, dann kann der Schleimhaut-Perioästbezug desselben erhalten bleiben und zum Abschluß der beiden Höhlen mit der Wangenschleimhaut vereinigt werden; vorher tamponiert man die Wundhöhle mit Jodoformgaze, die zum Naseneingang geleitet wird. Mußte dagegen der Weichteilüberzug des harten Gaumens geopfert werden, so tamponiert man die Wundhöhle und versorgt die Gesichtswunde durch sorgfältige Naht. Nach späterer Ausgleichung wird der fortgenommene Oberkieferknochen durch eine vom Zahnarzt verfertigte Prothese ersetzt, um den Schluckakt wieder zu ermöglichen, die Sprache zu verbessern und den Bulbus zu stützen.

In den letzten Jahren ist bei der Totalrefektion des Oberkiefers die Elektrokoagulation vermittle der chirurgischen Diathermie in Angriff genommen worden. Die Resultate ergeben allerdings keinen einheitlichen Erfolg. Hautant diskutiert die Vor- und Nachteile dieser Behandlung folgendermaßen: Vorteile sind:

1. Absolute Zerstörung des diathermisch erreichten Gewebes; aber die Notwendigkeit von innen nach außen zu arbeiten, macht diesen Vorteil hintällig, ebenso wird jede Übersicht, ob die Koagulationsnadel bzw. das Diathermiemesser noch im Tumor oder wirklich schon im Gefunden arbeitet, unmöglich gemacht. (Die Übersicht wird ja zudem durch das Verschorfen und Kochen der Geschwulst verhindert).
2. Die geringere Operationsmortalität durch das Vermeiden von größerer Blutung und geringere Sekretion der geschaffenen Wundfläche.

3. Besseres kosmetisches Resultat, da von innen im Munde operiert wird, was aber hinfällig wird, sobald Verwachsungen des Tumors mit der Haut sich finden.

Nachteile der operativen Diathermie sieht Hautant darin, daß infolge des Unvermögens der genauen Lokalisation der Wirkung Verlust an Gewebe (Haut, Schleimhaut, Knochen) eintreten kann, was besonders in der Regio ethmoidalis zu schweren Folgen (tötlicher Blutung) führen kann. Ein weiterer Nachteil ist die Ausstoßung von großen Sequestern usw.

Immerhin ist nach Ansicht des Verfassers das Diathermieverfahren als großes Hilfsmittel zu benutzen.

Holmgren tritt besonders warm für die Elektrokoagulation ein und hat in seiner Praxis große Erfolge damit erreicht. Weitere Versuche müssen zeigen, ob die Diathermie wirklich so viele Vorteile hat, daß man das Verfahren als großen Fortschritt in der Therapie der malignen Geschwülste bezeichnen kann.

Nachdem ich einen Ueberblick der heutigen Anschauungen über die Pathogenese, Aetiologie und Klinik der malignen Oberkiefertumoren gegeben habe, möchte ich nun einige der seit 1920 in der Freiburger Nasen-Hals-Ohrenklinik an einem malignen Oberkieferplasma zur Behandlung gekommenen Fälle anfügen.

1. Fall: B. W., 58 Jahre alt, Landwirt.

26. 11. 20. Pat. kam wegen behinderter Nasenatmung und klagte über häufiges Nasenbluten, sowie Kopfschmerzen.

In der r. Nasenhälfte wurden Polypen gefunden. Die mikroskopische Untersuchung ergab ein papillomatöses Carcinom, das noch kein destruktives Wachstum zeigte. Doch bestand bereits eine beträchtliche Atypie der Epithelien der Drüsen-schläuche. Eine Operation wurde dringend empfohlen.

29. 11. 20. Oberkieferrefektion r. — Es bestand ein papillomatöses Carcinom des Siebbeins. Die Operation war nicht radikal auszuführen, da auch die Lamina cribrosa ergriffen war. Nachbestrahlung.

10. 6. 24. Nach bisherigem Wohlergehen Luftundurchlässigkeit der Nase lks. Dort anscheinend ein Polyp.

14. 6. 24. Der Tumor umfaßte die ganze lk. Nase, die vorn und hinten vollkommen mit Tumormassen ausgefüllt war.

16. 7. 24. Partielle Oberkieferrefektion lks. Der Tumor wurde bis in die Lamina cribrosa hinein soweit als möglich entfernt. Offenbar war die Art des Tumors nicht sehr maligne, da es 4 Jahre gedauert hatte, bis das Carcinom nachgewachsen war.

6. 2. 26. In der lk. Nase fanden sich erneut Granulationen. Die Probeexcision ergab wieder papilläres Carcinom. — Bestrahlung.

Der Patient erlag nach einem Vierteljahr dem weiter fortwuchernden Carcinom.

2. Fall: O. R., 51 Jahre alt, Landwirt.

30. 9. 22. Der Pat. wurde wegen Oberkieferhöhleneiterung der Klinik überwiesen.

Befund: Stark fötide Kieferhöhleneiterung. Es steckte außerdem noch eine Wurzel von früher entfernten Zähnen. Dem Pat. wurde eine Radikaloperation vorgeschlagen.

18. 10. 22. Oberkieferresektion nach Denker. Eröffnung der Kieferhöhle. Die ganze Kieferhöhle war mit Tumormassen ausgefüllt. Durchmeißelung des Jochbeines und des Proc. naso-frontalis. Spaltung des harten Gaumens nach Exstruktion des lk. Schneidezahnes. Beim Versuch den Oberkiefer herauszudrehen, zeigte sich, daß die hintere Wand des Oberkiefers vollständig fehlte und von Tumormassen ersetzt war, die in die Fossa pterygopalatina, in das Siebbein und den Nasenrachenraum hineinwucherten. Die Tumormassen umwuchsen auch die lk. Tube und konnten nur mit Mühe entfernt werden. Tamponade. Teilweise Vereinigung der linksseitigen Gaumenfellreste mit der Wangenschleimhaut. Der Tumor ging auch auf die lk. Augenhöhle über und weit nach hinten bis an die Schädelbasis, sodaß nicht mit Sicherheit alles Krankhafte entfernt werden konnte. Nachbehandlung mit Radium- und Röntgenstrahlen. Mikroskopische Diagnose: Cancroid.

20. 11. 22. Entlassung nach gut überstandener Operation. Pat. starb 1 Jahr nach seiner Entlassung.

3. Fall: Th. F., 57 Jahre alt, Tagelöhner.

Pat. litt seit längerer Zeit an schlechter Luftdurchgängigkeit der lk. Nasenseite.

14. 1. 24. Es wurde ein Nasenpolyp extrahiert, wobei eine auffallend starke Blutung stattfand.

18. 3. 24. Pat. kam wieder, da er erneut behinderte Nasenatmung hatte.

Befund: die ganze lk. Nasenseite war durch ein sich derb-elastisch anführendes Gewebe ausgefüllt, das zuerst den Eindruck eines Polypen machte, aber von mehr rötlicher Farbe und derberer Konsistenz war. Eitrige Sekretstreifen zwischen mittlerer Muschel und Septum. Die ganze lk. Choane von Tumormassen ausgefüllt und schmierig eitrig belegt.

Die Diaphanoskopie zeigte eine Verfärbung der lk. Kieferhöhle. Bei der Probepunktion stieß man mit der Nadel auf einen kissenartigen Widerstand. Wenig, stark übelriechendes Sekret. Bei der Palpation der facialis Kieferwand glaubte man durchgebrochene Tumormassen zu fühlen.

Eine Probeexzision aus der Nase ergab: Plattenepithelcarcinom.

Das Gebiß war stark defekt; die meisten Zähne fehlten. Der harte Gaumen war lks. an einer kleinen Stelle vorgewölbt. — Die Röntgenaufnahme zeigte eine starke Verfärbung der lk. Kieferhöhlen- und Siebbeingegend.

19. 3. 24. Operation in Lokalanästhesie: praeliminäre Ligatur der Carotis ext. Weichteilschnitt nach Weber. Totale Resektion des Oberkieferknochens. Die ganze laterale Nasenwand war

durch die Tumormassen zerstört, der Tumor hatte die faciale Wand der Kieferhöhle durchbrochen. Die hintere Wand der Höhle fehlte vollständig, auch bestanden Einwucherungen in die Fossa pterygo — palatina. Der Tumor konnte nicht reißlos entfernt werden, daher 3malige Röntgen-Nachbestrahlung mit $\frac{1}{3}$ der Max. Dosis.

3. 5. 24. Die Wundhöhle sah gut aus. Eine Probeexcision aus der Hinterwand ergab: hier und da ausgedehnte Rundzelleninfiltrate, die z. T. aus Leukocyten bestanden. Tumorelemente waren in den unterluchten Schnitten nicht nachzuweisen.

3. 9. 24. Das lk. Auge war stark vorgewölbt, die Umgebung geschwollen, z. T. derb infiltriert. Der Bulbus konnte nicht mehr bewegt werden. Die lk. Nasenhälfte war ebenfalls infiltriert. Die äußere Nase erschien plump in ihren Konturen. Vom Nasenrachenraum aus sah man die lk. Nasenhälfte in weitem Abchnitt durch einen blumenkohlartigen Tumor verlegt.

23. 9. 24. Exitus letalis.

4. Fall: A. W., 60 Jahre alt, Ehefrau.

1. 12. 25. Anamnese: Seit ungefähr $1\frac{1}{2}$ Monaten bemerkte Pat. eine schmerzhaftige Schwellung der r. Wangengegend, die langsam zunahm. Die Schmerzen traten vor allem nachts auf und äußerten sich als Reißen und Ziehen im Gebiet des r. Oberkiefers, bis in den Gaumen ausstrahlend.

Befund: Weichteilschwellung der r. Wange unterhalb des Auges bis zum r. Mundwinkel. Nasolabialfalte verstrichen. Die Haut über der Schwellung war gespannt und schlecht abhebbbar, die Schwellung selbst auf der Unterlage unverrückbar. Man konnte sie nach oben gegen den Margo infraorb., nach hinten gegen den Proc. zygomaticus, nach unten gegen den Proc. alveolaris und nach innen gegen die Fossa canina und die Apertura piriformis abgrenzen. Der Gaumen war nicht vorgetrieben. In der Nase zeigte sich ein großer Schleimhautpolyp im r. mittleren Nasengang, der die mittlere Muschel gegen das Septum drängte. Kein Eiter. Diaphanoskopie und Röntgenaufnahme zeigten eine Verwachsung der r. Kieferhöhle. Die Spülung der r. Kieferhöhle ergab eine klare Spülflüssigkeit, nach Extraktion des Polypen floß kein Sekret nach.

7. 12. 25. Kieferhöhlenoperation nach Denker in Leitungsanästhesie. Nach Abziehen des Periosts fiel man auf der Wangenseite mit dem Raspatorium in große Tumormassen, welche breitbasig in die Wangenmuskulatur hineingewuchert waren. Die laterale Wand der Kieferhöhle war von Tumormassen durchbrochen. Von dieser Öffnung aus wurde die ganze faciale Wand der Kieferhöhle abgetragen. Die Kieferhöhle war vollkommen von Tumormassen ausgefüllt. Das Siebbein wurde zur Sicherheit mit ausgeräumt. Beim Abtragen der Wangenmuskulatur sah man, daß die Tumormassen weit nach hinten gingen. Man konnte einen Parotistumor vermuten. Wegen der großen Ausdehnung wurde die Operation abgebrochen. Druckverband.

10. 12. 25. Versuch, die restlichen Tumormassen mittels Diathermie auszurotten. Es zeigte sich dabei, daß der Tumor bis

unmittelbar unter die Wangenhaut vorgedrungen war. Mit Rücksicht auf die weite Ausdehnung wurde das Verfahren abgebrochen und evtl. spätere Röntgenbehandlung in Frage gezogen.

Pat. ging es am nächsten Tage gut. Abends starke motorische Unruhe. Am 12. 12. war Pat. vollkommen somnolent. Gegen Morgen trat unter den Erscheinungen der Atemlähmung der Exitus letalis ein.

Die extirpierten Tumormassen zeigten das Bild eines cirrösen Plattenepithelcarcinoms.

5. Fall: Dr. F., praktischer Arzt, 52 Jahre alt.

Der Patient war an einer Zahncyste operiert worden, wobei man ein Fibrom fand. Seit einiger Zeit spürte er nun eine Schwellung der linken Wange. Es bestand auch ein übelriechender Ausfluß aus der Nase und Druckschmerzhaftigkeit der Gegend der linken Kieferhöhle. Bei der Untersuchung fand sich eine Fistel in der Fossa canina und ein Infiltrat in der linken Wange. Die histologische Untersuchung der aus der Fistel entfernten Granulationen ergab ein beginnendes Plattenepithelcarcinom. 8. 11. 26 Operation nach Denker. 20. 11. Entlassung. 1 Jahr später Tod an intercurrenter Krankheit.

6. Fall: A. H., 66 Jahre alt, Gipser.

Seit 1926 wiederholt in Behandlung wegen Nebenhöhlenaffektion. Operation abgelehnt. Im August 29 Anlegen einer Daueröffnung in die rechte Kieferhöhle vom rechten unteren Nasengang aus, ebenso links. Von dort aus Spülbehandlung beider Kieferhöhlen, die foetide riechenden, blutig schmierigen Eiter entleerten. Am 5. 11. 29 Fistel im linken Os maxillare, die zur Kieferhöhle führte, blutiges Sekret. Aus der rechten Kieferhöhle entleerte sich massenhaft übelriechender Eiter. Am 18. 11. 29 Operation der Kieferhöhlen nach mehrtägiger Vorbereitung des Kreislaufs. In Lokalanästhesie Radikaloperation beider Kieferhöhlen nach Denker. Die Schleimhaut beider Höhlen war polypös entartet. Die mediale Hälfte des linken Kieferhöhlendaches war durch Granulationsgewebe ersetzt, das sich bis in den Bereich des linken Siebbeins erstreckte und mit demselben ausgeräumt wurde, da es einen tumorverdächtigen Eindruck machte. Das freiliegende Operationsfeld wurde darauf mit Diathermie verschorft, sodaß soweit mikroskopisch sichtbar, das fragliche Tumorgewebe entfernt war. Die histologische Untersuchung ergab einen verhornenden Plattenepithelkrebs mit sehr reichlich bindegewebigem Stroma. Am 17. 1. 30 wurde der Pat. wegen eines schon bald sich zeigenden Exophthalmus links augenärztlich untersucht. Diagnose: Ausbreitung eines Tumors am Orbitalboden, besonders nasalwärts, ausgehend vom Oberkiefer. Operativ wäre eine radikale Resektion des Oberkiefers mit Ausräumung der Orbita unter Preisgabe des funktionstüchtigen Bulbus angezeigt gewesen, doch verweigerte der Patient jeglichen Eingriff.

7. Fall: A. R., 63 Jahre alt.

Die Patientin litt seit Februar 26, 8 Wochen lang an linksseitigem Nasenbluten, das sich im Laufe der Zeit verstärkte. Das

Hörvermögen war gestört, beim Blick nach unten traten Doppelbilder auf. Der lokale Befund ergab eine Vortreibung der facialis Wand der linken Kieferhöhle, außerdem Exophthalmus links. Das linke Cavum nasi war mit Polypen ausgefüllt, die anscheinend aus dem mittleren Nasengang kamen. Die obere Fläche der Polypen war glatt, auf Sondenberührung leicht schmerzhaft, nicht blutend. Die polypösen Massen erstreckten sich bis zum Nasenrachenraum, sodaß das linke Tubarostium nicht übersehbar war. Das Röntgenbild zeigte eine völlige Verschattung der linken Oberkieferhöhle und des linken Siebbeines. Am 22. 4. 26 wurde eine Probeexcision aus dem tumorverdächtigen Gewebe gemacht. Mikroskopisch handelte es sich um ein in breiten Zügen wachsendes Basalzellencarcinom mit reichlichen Zellteilungsfiguren. Da Patientin über zunehmende Kopfschmerzen klagte, ferner auf dem linken Auge kaum mehr sah, mußte bei der Aussichtslosigkeit des Falles von einer Operation Abstand genommen werden und Patientin wurde unter Pantopon gestellt. So wie das Narkotikum wegiel, klagte die Patientin über heftigste Kopfschmerzen. Die Schwellung der linken Wange nahm weiter zu, desgl. die Protusio bei der Bulbi. Die Patientin hatte auch keine Lichtempfindung mehr und verfiel zusehends. Am 15. 7. 26 Tod an Herzschwäche. Die Sektion ergab ein weiches Carcinom der linken Kieferhöhle mit Einbruch in die Nasenhöhle, Orbita, Sieb- und Keilbeinhöhle. Hühnereigroßer, dem linken Os maxillare auflitzender Tumorknoten mit Vorwölbung der linken Wange. Umwachsung und Hochdrängung der Hypophyse durch die geschwulstdurchwachsende Sella turcica. Ummauerung der Nervi optici und der Carotis interna. Multiple erbsen- bis kirschkerngroße Metastasen in der Leber. Geschwulstdurchwachsung der linken Nebenniere.

8. Fall: A. G., 65 Jahre alt, Uhrmacher.

Der Patient wurde im Juli 26 von einem Radfahrer angefahren, dabei sollte eine Blutung aus der Nase stattgefunden haben. Von dieser Zeit an hatte er hin und wieder leichte Kopfschmerzen, die sich im Dezember verstärkten. Gleichzeitig entleerten sich aus der linken Nasenseite eitrige Massen, deren Geschmack der Patient auch manchmal im Munde spürte. Bei der Aufnahme in die Klinik am 10. 1. 27 zeigte die linke Infraorbitalgegend eine Auftreibung bis zur Fossa canina, ebenso eine Infiltration der linksseitigen Gaumenplatte. Die linke Nasenhälfte war von bröcklich eitrigem Sekret angefüllt. Nach dessen Fortwischen sah man an der lateralen Nasenwand leicht blutende Granulationen, durch welche man mit der Sonde in die Kieferhöhle hineingelangte. Das vordere Ende der mittleren linken Muschel war papillär hypertrophisch und fappig unterteilt, auf Berührung leicht blutend. Das Röntgenbild zeigte die lateralen Konturen der Nasenwand verschleiert und unscharf begrenzt. Die linke Kieferhöhle war diffus verschattet, gleichzeitig die Siebbeinzellen. Am 12. 1. 27 Probeexcision aus der lateralen linken Nasenwand. Sie ergab ein diffus in schmalen und breiten Zügen und Zapfen verwachsendes, nur ganz geringe Verhornungstendenz zeigendes Plattenepithelcarcinom mit reichlichen Mitosen. Am 25. 1. 27 Resektion des linken

Oberkiefers, Ausräumung des Siebbeines und der Flügelgaumen-grube. Coagulationsnekrose mit Diathermie der ganzen Wundhöhle. Nachbehandlung mit Röntgenstrahlen (4 Sitzungen). Trotzdem zeigten sich am 6. 4. oberhalb des linken Jochbogenanatzes oedematöse Durchtränkung des Gewebes und Lidoedem. Eine Probeexcision ergab erneut Plattenepithelkrebs. Am 8. 5. 27 Entlassung. Am 9. 8. 27 Exitus.

9. Fall: H. F., 57 Jahre alt, Küfer.

8. 7. 27. Der Patient klagte über behinderte Nasenatmung rechts. Angeblich bestand hin und wieder eitrigem Ausfluß aus der Nase. Seit 5 Wochen bestand eine Anschwellung unterhalb des rechten Auges, die den Patienten zur Augenklinik gehen ließ. Von dort wurde er dem Rhinologen überwiesen. Die Untersuchung zeigte in der rechten, sehr engen Nasenhälfte eine stark hypertrophische untere Muschel. Im unteren Nasengang befanden sich höckerige Granulationen, die bei Berührung stark bluteten und nach Cocainisierung kaum anschwellen. Eine Probeexcision ergab das histologische Bild eines Plattenepithelcarcinoms. Die Röntgenaufnahme zeigte eine Verschattung der rechten Kieferhöhle. Vom 10. 7. 27 bis 29. 7. 27 4 Röntgenbestrahlungen, worauf die inneren wie die äußeren Schwellungen weitgehend zurückschritten. Am 13. 10. 27 erneute Röntgenbestrahlung. Am 29. 10. 27 wurden im rechten mittleren Nasengang deutliche Tumormassen sichtbar. Der Tumor wuchs trotz weiterer Bestrahlung rapide und brach am 26. 12. nach außen durch. Am 20. 12. war auch der harte Gaumen perforiert. Erst jetzt ließ sich der Patient in Klinik aufnehmen, nachdem auch die Infraorbita ungefähr 5 cm zur Seite hin tiefe Einschnitzungen des Knochens aufwies. Der Patient mußte dauernd unter Morphium gehalten werden. Am 16. 2. 28 war die Nase fast völlig zerstört. Am 29. 2. 1928 Exitus an Bronchopneumonie.

10. Fall: G. M., 64 Jahre alt, Fabrikarbeiter.

21. 12. 27. Der Patient klagte über Kopfschmerzen in der linken Gesichtshälfte. Seit einigen Wochen litt er an eitrigem Ausfluß aus beiden Nasenhälften. Bei der Untersuchung fand sich Eiter im rechten mittleren Nasengang. Die linke laterale Nasenwand war von Tumormassen durchwachsen, die Muscheln davon teilweise zerstört und von Eiter umspült. Das Röntgenbild zeigte eine Verschattung beider Kieferhöhlen und eine eigenartige Verschleierung der linken Siebbein- und Stirnhöhlenpartie. Die Probeexcision aus dem linken mittleren Nasengang ergab die Diagnose: Polymorphzelliges Plattenepithelcarcinom. Am 8. 1. 28 Radikaloperation der rechten Kieferhöhle, der linken Kieferhöhle und des linken Siebbeines. Die rechte Kieferhöhle war angefüllt mit dicken Granulationsmassen und foetid riechendem Eiter. Nach Ausräumung aller krankhaften Partien zeigte sich das Siebbein frei von Tumormassen. Die linke Kieferhöhle war ebenfalls von foetid riechenden Tumormassen durchsetzt, das Siebbein sowie das Kieferhöhlendach waren nach dem Bulbus zu völlig eingeschmolzen. Nach Entfernung der Tumormassen

wurden tumorverdächtige Stellen zum Schluß mit Diathermie koaguliert und die mediale Kieferhöhlenwand samt den Stümpfen der mittleren und unteren Muschel abgetragen. Am 4. 2. 28 Entlassung nach vorheriger Röntgennachbestrahlung. 14. 8. 28 Wiederaufnahme wegen Recidiv an der Vorderwand der linken Kieferhöhle. 16. 8. 28 Operation des Recidivs durch Ausbrennen mit dem Thermokauter. Ein Teil der Haut der linken Nasolabialfalte mußte mitentfernt werden. Es zeigte sich, daß der Knochen nach dem Jochboden zu mit etwa nußgroßen Carcinommassen angefüllt war, die bis weit ins Gefunde hinein koaguliert wurden, desgleichen wurde die tumorverdächtige Hinterwand der Höhle durch Stichelung koaguliert. Trotzdem zeigte sich am 30. 9. 28 ein neues Recidiv im Jochbein und am unteren Orbitarand. Radiumbehandlung blieb erfolglos.

Am 25. 1. 29 Exitus.

11. Fall: H. R., 49 Jahre, Tagelöhner.

Der Patient hatte 8 Jahre lang Eiterausfluß aus der Nase und Kopfschmerzen. Die Röntgenaufnahme am 1. 10. 27 ergab eine deutliche Verschattung der linken Stirn- und Kieferhöhle. Da sich die Beschwerden mit Spülungen und Kopflichtbädern behoben, stellte man anfangs die Diagnose auf linksseitiges Kieferhöhlenempyem. Am 7. 3. 28 kam der Patient erneut mit linksseitigen Kieferschmerzen. Im linken Oberkiefer fehlten sämtliche Zähne. Anstelle der Praemolaren war ein etwa daumengroßer Defekt, von dem aus man mit der Sonde in die linke Kieferhöhle gelangte. Am 17. 3. 28 Radikaloperation der linken Kieferhöhle nach Denker. Die Kommunikationsöffnung von Mund- und Kieferhöhle wurde durch Plastik mittels eines in der Wange gestielten Schleimhautlappens geschlossen. Leider war sie ohne Erfolg. Darum am 13. 9. 28 eine nochmalige Operation zur Schließung des Defektes. Dabei fand man den Knochen des Alveolarfortsatzes ganz morisch. Untersuchung eines excidierten Stückes ergab ein teilweise verhornendes Plattenepithelcarcinom. Deshalb partielle Oberkieferresektion ohne Schnitt der äußeren Weichteile. Nachbehandlung mit Radiumstrahlen. Am 11. 12. 28 Recidiv am Jochbein, Radiumbehandlung. Am 17. 5. 29 Aufgabe der Therapie wegen plötzlich einsetzender Kreislaufschwäche. Exitus letalis.

12. Fall: G. Pf., 56 Jahre, Schneidermeister.

Anamnese: Der Patient litt bereits im Felde an Nasenhöhlenentzündung mit Kopfschmerzen und eitrigem Nasenausfluß. 1917 wurden ihm 4 Zähne aus dem Oberkiefer entfernt, wobei sich Eiter unter den Zähnen vorgefunden haben soll. 1920 war Patient in Behandlung wegen Nebenhöhleneiterung. 1925 Mittelohrkatarth, der auf eine Schwellung der rechten unteren Nasenmuschel und Verbiegung des Septums zurückgeführt wurde. Am 18. 7. 28 erstmaliger Eintritt in die Klinik wegen behinderter Nafenatmung. Befund: Schleimig-eitriges Sekret im rechten mittleren Nafengang. Septumdeviation, Hypertrophie der unteren Muschel rechts mit polypöser, tumorartiger Verdickung, besonders am hinteren Ende

der rechten Muschel; Spülung der rechten Kieferhöhle ergab flockigen Eiter. Die Röntgenaufnahme zeigte eine Verschattung der rechten Kieferhöhle. Die histologische Untersuchung eines probeexciidierten Stückes aus dem verdickten hinteren Teil der mittleren Muschel ergab das Bild einer chronisch-entzündlichen Neubildung. Es fand sich kein Anhaltspunkt für einen echten Tumor. Eine Operation wurde vom Patienten abgelehnt. Ein Jahr später, im Juli 29, Wiederaufnahme.

Völlige Verlegung der Nase und heftige Kopfschmerzen waren die Beschwerden. Der Nasenrachenraum war durch Tumormassen ausgefüllt. Drüenschwellungen im Bereiche des Nackens und Halses rechts. Vorwölbung des rechten harten Gaumens, Verfrichten des Alveolarfortsatzes, im rechten Oberkiefer fehlten die Zähne. Am 7. 7. 29 Resektion des rechten Oberkiefers. Carotis und Thyreoidea sup. wurden unterbunden. Weichteilschnitt nach Weber. Orbitalboden und Siebbein waren frei von Tumor. Dagegen Tumormassen entlang der Schädelbasis im Bereich der Flügelgaumengrube. Sie wurden mit Diathermie ausgeräumt. Die mikroskopische Untersuchung des Tumors ergab jetzt ein Peritheliom, mit Verdacht auf einen Basalzellentumor. Gute Heilung, am 11. 9. 29 Entlassung. Gebißplatte bis zur Schließung des Gaumendefektes vorgesehen. Bis heute rezidivfrei.

13. Fall: A. E., 57 Jahre alt, Bahnarbeiter.

3. 12. 28. Der Patient kam wegen einer zunehmenden Schwellung unter dem rechten Auge, hatte aber keine Schmerzen und keine Sehstörungen. Befund: Die Haut unterhalb des rechten Auges war leicht bläulich verfärbt. Man sah eine tumorartige Vorwölbung der ganzen facialem Kieferhöhlenwand. Die Geischwult war unverrückbar und zeigte keine Fluktuation. Im mittleren rechten Nasengang fand sich dünnflüssiger Eiter. Eine Probeaspülung der rechten Kieferhöhle zeigte Blut, aber keinen Eiter. Auf dem Röntgenbild war die Kieferhöhle verschattet, das Siebbein frei. 11. 12. 28 Resektion des rechten Oberkiefers. Es zeigte sich, daß der Tumor hauptsächlich den Knochen in der Jochbein-egend befallen hatte. Es schoben sich auch breite Zapfen nach hinten ins Siebbein. Die Tumormassen wurden ausgeräumt und in der Tiefe elektrokoaguliert. Glatter Heilverlauf. Nachbehandlung mit Radium. Der Patient ist rezidivfrei.

14. Fall: C. K., 69 Jahre, Witwe. }

Die Patientin spürte seit etwa 10 Jahren eine Behinderung der Nasenatmung. Bei der Untersuchung am 8. 5. 28 waren beide Vestibuli nasi vollständig durch polypöse Massen verlegt. Das postrhinokopische Bild zeigte eine Verlegung beider Choanen. Die Diaphanoskopie ergab eine symmetrische leichte Verschattung beider Infraorbitalpartien. Auf dem Röntgenbild waren beide Kieferhöhlen wie auch das rechte Siebbein verschattet. Am 11. 5. 28 Polypenextraktion; beiderseits wurden die Siebbeine, die mit polypösen Massen ausgefüllt waren, ausgeräumt. Die Patientin verlor wenig Blut, keine Tamponade. 20 Minuten nach Beendigung des Eingriffs Aussetzen der Herztätigkeit und Atemstillstand.

15. Fall: A. Sch., 45 Jahre, Bürgermeister.

5. 7. 28. Der Patient wurde zur Operation überwiesen wegen Carcinom des weichen Gaumens. Am 7. 7. 28. Operation mit Kaltkauflik. Histologischer Befund: Stellenweise verhornendes Plattenepithelcarcinom. Nachbehandlung mit Röntgenbestrahlung. Trotzdem Zunahme der Beschwerden, Metastasenbildung.

6. 10. 28. Exitus letalis.

16. Fall: A. F., 57 Jahre, Ehefrau.

Im Oktober 29 wurde die Patientin von der Augenklinik mit folgendem Bericht des praktischen Arztes geschickt:

„Ich stelle in der Sprechstunde einen rechtsseitigen Exophthalmus fest. Die Patientin habe ich vor einem Jahre etwa wegen einer Geschwulst in der Nase behandelt. Der Tumor wurde dann operiert und erwies sich histologisch als Peritheliom. Jetzt scheint der Tumor weiter gewuchert zu sein und aufs Auge übergegriffen zu haben.“

Die Beschwerden der Patientin bei der Aufnahme waren vollständige Verlegung der Nasenatmung rechts, zeitweilige Blutungen aus der rechten Nasenöffnung.

Befund im Oktober 29: Mäßige Protusio bulbi rechts, die vordere Oberkieferwandung war erweicht, etwas vorgewölbt, die Gaumenplatte auf der rechten Seite war ebenfalls eindrückbar. Nase rechts vollkommen durch Tumormassen verlegt. Septum nach links herübergedrückt, wodurch auch die linke Nasenhälfte verlegt war. Der Tumor füllte die rechte Choane aus, und war auch in den Nasenrachenraum vorgewachsen. Am 17. 10. 29 Oberkieferresektion in örtlicher Betäubung mit Intubation und leichter Chloroform-Aether-Narkose. Es handelte sich um einen großen, traubenförmig wachsenden Tumor, der an der seitlichen Begrenzung der Kieferhöhle fest mit dem Knochen verwachsen und nach dem Siebbein zu vorgewachsen war, wodurch die Protrusio bulbi entstanden war. Der Tumor ließ sich regelmäßig gut aus der Umgebung, die gesund aussah, herauslösen. Der orbitale Boden wurde mit entfernt, der Bulbus selber konnte erhalten bleiben. Tamponade, große Situationsnaht des Gaumens mit der seitlichen Mundschleimbaut, Hautnaht. — Vor der Operation wurde die Carotis externa dicht oberhalb der Teilungsstelle unterbunden. Guter Heilverlauf. Am 3. 12. 29 Entlassung, von der Zahnklinik sollte eine Gaumenprothese verfertigt werden. 26. 6. 30. Die Patientin klagte über stechende Schmerzen in der rechten Gesichtshälfte. Kein Rezidiv, vermutlich Trigemini-Neuralgie, Röntgenbestrahlung, danach Besserung der Beschwerden. 4. 10. 30. In der Narbe und im Orbitalwinkel erbsengroße Knötchen, Verdacht auf ein Rezidiv.

Am 7. 10. 30. 2. Operation: Hautschnitt parallel zum alten Operationschnitt. Die Haut war fest mit den darunter liegenden Tumormassen verwachsen und wurde mittels Diathermie von den Tumormassen entfernt. Das alte Operationsgebiet war ausgefüllt mit einem kleinapfelgroßen Tumor, dieser erstreckte sich bis in die Flügelgaumengrube, nach hinten oben bis in das orbitale Fettgewebe. Der Tumor wurde mittels Diathermie entfernt, wobei

lich eine ausgedehnte Durchkochung des periorbitalen Gewebes nicht vermeiden ließ. Schließung der Wunde mittels Hautnaht. 20. 3. 31. Bohnengroßer Knoten am Augewinkel rechts. Eine Probeexcision ergab das typische Bild eines Balalzellentumors. 14. 4. 31. Operation: Enucleation des rechten Auges; die Orbita, die bis zur Schädelbasis mit Tumormassen angefüllt war, wurde ausgeräumt. Dabei zeigte sich, daß sich der Tumor bis zur Lamina cribrosa erstreckte. 5 Stunden post Operationem trat der Tod ein unter den Erscheinungen der Kreislaufschwäche. Die Sektion ergab: Durchbruch des Carcinoms in die Schädelbasis mit Eröffnung der Lamina cribrosa. Tumor-Metastasen in Lunge und Pleura.

17. Fall: E. K., 69 Jahre.

16. 6. 30. Seit 2 Monaten spürte die Patientin eine langsam stärker werdende Schwellung der rechten Oberkiefer- und Jochbeingegend, die sich nach der Extraktion einiger Zähne aus dem Oberkiefer zuerst einstellte. Das Röntgenbild gab keinen sicheren Aufschluß. Die Probeexcision ergab ein Plattenepithelcarcinom mit vereinzelt Spindelzellen und lymphoiden Elementen. Am 20. 6. 30. Oberkieferrektion des rechten Oberkiefers. Dabei zeigte sich, daß der Knochen der Kieferhöhle bereits von Carcinommassen durchbrochen war. Nach der Operation fühlte sich die Patientin zunächst wohl, doch wurde Anfang Juli das Allgemeinbefinden schlechter. (Lungenpneumonie, fragliche Metastasen). Am 6. 7. Exitus an Pneumonie und Herzschwäche. Autopsie nicht getattet.

18. Fall: R. K., 46 Jahre alt, Holzbildhauer.

20. 10. 30. Der Patient wurde vom praktischen Arzt überwiesen mit der Diagnose: Adenocarcinom des linken Oberkiefers. Die linke Nase war vollkommen verstopft von Tumormassen, eine Kieferhöhlenpülung war nicht möglich. Die Probeexcision bestätigte die Diagnose Adenocarcinom. Es wurde die Operation der linken Kieferhöhle vorgenommen am 12. 11. 30. Am 7. 9. 31. Recidiv, Versuch einer Röntgenbestrahlung. Da sie erfolglos blieb, Operation des Recidivs am 17. 11. 31. Der Tumor wurde vom Proc. alveolaris ausgehend koaguliert. Das Recidiv erstreckte sich bis ins Wangenfett, in das Keilbein und das Siebbein hinein. In die Operationshöhle wurde Radium eingelegt. Vor der Ausräumung wurde die Carotis unterbunden. Am Abend der Operation atmete der Patient plötzlich flach, nach 2 Minuten Atemstillstand. Eine Blutung war nicht nachzuweisen. Die Sektion ergab als Todesursache Fettembolie.

19. Fall: J. K., 62 Jahre, Landwirt.

20. 7. 31. Der Patient klagte über heftige Schmerzen in der Gegend der rechten Kieferhöhle, die nach Nase und Orbita ausstrahlten. Gleichzeitig bestand ein blutigwässriger Ausfluß aus der Nase. Die Untersuchung der Nase zeigte eine höckerige Schwellung der rechten mittleren und unteren Muschel. Im mittleren

Nafengang sah man blutigeitriges Sekret. Bei der Diaphanoskopie war die rechte Kieferhöhle stark verschattet. Eine Probespülung ergab eitrigblutiges Sekret. Die Röntgenaufnahme ließ mit größter Wahrscheinlichkeit einen Tumor vermuten. Die Operation wurde angeraten. Am 30. 7. Operation: Nach Eröffnung der rechten Kieferhöhle sah man dieselbe völlig von einem weichen Gewebe ausgefüllt, das aber nicht polypös erschien. Siebbein, laterale Nasenwand, wahrscheinlich auch die Orbita und das Keilbein waren mitergriffen. Relektion der lateralen Nasenwand und Ausräumung der Tumormassen mittels Elektrokoagulation. Die histologische Untersuchung ergab ein Plattenepithelcarcinom. Postoperative Röntgenbestrahlung. Nachbehandlung mit stumpler Kieferhöhlenspülung und Selbstspülung der Nase. 16. 10. 31 knotige Drüsen, Recidiv am Jochbogen rechts mit Fixatio bulbi. Nach 2 Monaten zur Bestrahlung bestellt. 24. 10. 31 plötzlich Exitus zuhause.

20. Fall: E. Sch., 18 Jahre alt, Schülerin (blind).

Im Alter von 4 Jahren wurden der Patientin beide Augen enucleiert wegen Gliomwucherungen. Am 21. 3. 31 klagte die Pat. wegen Behinderung der Nasenatmung, die sie seit 2—3 Wochen spürte. Daneben bestand leichter Kopfschmerz.

Befund: Aus beiden Nasenlöchern, besonders aus dem lk., entleerte sich blutig-schleimiger Ausfluß. Die lk. Nasenhälfte war vollkommen verlegt, auch die rechte war mit zahlreichen Granulationen ausgefüllt. Im Nasenrachenraum befand sich ein großer, den ganzen Raum ausfüllender Tumor. Das Röntgenbild zeigte eine dichte Verschattung beider Siebbeine, Kieferhöhlen und des Nasenrachenraumes.

Die histologische Untersuchung einer Probeexcision ergab ein polymorphzelliges Sarkom aus Spindel- und Riesenzellen.

Die Therapie bestand in Röntgenbestrahlung, und zwar wurde Dreifelderbestrahlung durchgeführt, jedes Feld mit 120% der HED (500) beschickt, gefiltert mit 1 mm Aluminium. Bestrahlungsdauer 18 Tage. Der Erfolg der Strahlenbehandlung war über Erwarten gut. Der Tumor war weitgehendst eingeschmolzen. Die rechte Nasenhälfte und der Nasenrachenraum waren vollkommen frei. Die lk. Nasenhälfte war ebenfalls gut durchgängig für Luft. Auf der mittleren Muschel lks. sah man einige Borken und granulationsartige Wucherungen, sonst o. B. 24. 9. 31. Seit einigen Wochen fühlte Pat. Schmerzen in der lk. Augengegend. Auch klagte sie darüber, daß die lk. Nasenhälfte undurchgängig sei und anfangs eitrig, in den letzten Tagen blutig secerniere.

Der Befund ergab: Mäßiger Druckschmerz unter dem lk. Auge ohne Schwellung. Die lk. Nase war mit Blutkoagula angefüllt und von Granulationen verlegt. Rechte Nasenhälfte frei. Im Nasenrachenraum Vorwölbung von links her. — Versuch einer 2. Röntgenbestrahlung, doch wurden danach die Schmerzen so stark, daß die Pat. seither unter starken Narkotika gehalten werden mußte.

Unter diesen Tumoren des Oberkiefers fällt als häufigste Erscheinungsform das Plattenepithelcarcinom ins Auge. Von

den 20 Fällen fanden sich 13 mit der Diagnose: Plattenepithelkrebs. Die Neoplasmen zeigten teilweise Verhornungstendenz, teilweise kamen die bereits beschriebenen papillär-zottigen Formen zur Beobachtung, die in breiten Zügen und Zapfen in die Tiefe wachsend, zu Einschmelzungen des Gewebes bzw. des Knochens führten.

Einige Fälle erscheinen besonders interessant in Bezug auf ihre Entstehungsursache. So scheint Fall 5 eine Bestätigung für die Ansicht Lindemann's, der eine Entwicklung maligner Tumoren, besonders der Kiefertumoren, aus gutartigen Geschwülsten vertritt. Er erwähnt besonders die Epithelcysten als Ausgangspunkte für Kiefertumoren. Sollte nicht die in der Anamnese des Falles erwähnte operierte Zahncyste Ausgangspunkt einer zunächst gutartig erscheinenden Geschwulst, des Fibroms gewesen sein, das seinerseits in geringen stehengebliebenen Operationsresten später maligne entartete? Andererseits läßt sich vermuten, daß die Operation selbst ein Irritationsmoment für ein malignes Wachstum gewesen sein könnte, obschon zur Auslösung dessen eigentlich nur mehrmaliges operatives Eingehen als chronisches Reizmoment in Frage käme. Bei dem sehr seltenen Vorkommen einer Umwandlung einer gutartigen Geschwulst in eine maligne, muß man allerdings diesem ätiologischen Anhaltspunkt sehr skeptisch gegenüberstehen.

Fall 2, 6, 11 und 12 erinnern an die von Borst betonte Geschwulstentstehung auf dem Boden von chronischen Entzündungen und im Zusammenhang von geschwürigen Prozessen, die als chronische Irritationen wirken können. Die Patienten zeigen in ihrer Anamnese die anfängliche Diagnose: Nebenhöhlenentzündung und sind alle mehrere Jahre wegen Nebenhöhlen-Affektionen in Behandlung gewesen. Erst viel später ließ sich ein Tumor mit Sicherheit nachweisen. Besonders einleuchtend scheint die Entwicklung bei Fall 12. Die Erkrankung beginnt mit einer Zahneiterung, die wahrscheinlich als Ursache der bald darauf beginnenden Oberkieferhöhlenentzündung angesehen werden kann. Aus der Entzündung wird eine Eiterung, die chronisch geworden zunächst, wie die erste Probeexcision ergibt, eine chronischentzündliche Neubildung, ein Granulom, hervorruft. Ein Jahr später zeigt das mikroskopische Bild des operativ entfernten Tumors die deutlichen Symptome einer bösartigen Geschwulst.

Wie im Anfangsteil erwähnt, kann es in vielen Fällen allerdings zu einem Nebeneinander von Entzündung, gut-

artigem und bösartigem Tumor kommen. Häufig ist auch ein Tumor das Primäre, zu dem sich eine Nebenhöhleneiterung hinzugesellt, nicht selten hervorgerufen durch Stagnation und Zersetzung des Sekretes. Aus diesem Zusammengehen von Entzündung und Tumor läßt sich die Frage, ob der Tumor oder die Eiterung zuerst bestand, keineswegs klar beantworten, wie auch nicht der sichere Schluß gezogen werden kann, daß zwischen beiden Erkrankungen ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Andererseits ist darauf hingewiesen worden, daß auf Grund von entzündlicher Schleimhautdegeneration über dem Weg einer zunächst gutartig entzündlichen Neubildung, Polyp, maligne Tumoren entstehen können. Umgekehrt kann aber auch durch den Wachstumsreiz eines malignen Tumors Polypenentstehung in der Umgebung ausgelöst werden. Sicher gilt für die Umwandlung eines gutartigen Polypen in eine bösartige Geschwulst auch heute noch die Ansicht Billroths: „Beide Geschwülste haben nur insofern einen Zusammenhang, als sich bei einem Menschen, dessen Nasenschleimhaut zu Neubildungen disponiert ist, Konstitutionsverhältnisse entwickeln können, unter deren Einfluß die nächste Produktion einen bösartigen Charakter annimmt.“

Das einmalig gesetzte Trauma bei Fall 18 kann kaum die auslösende Ursache des 5 Monate später diagnostizierten Tumors gewesen sein. Wohl aber könnte man annehmen, daß durch die wahrscheinlich starke Erschütterung beim Unfall das Wachstum der vorher noch latent gebliebenen Geschwulst bedeutend angeregt worden ist, sei es, daß durch die stattgefundenen Blutung eine Weiterpflanzung von Tumorzellen stattgefunden hat, sei es, daß durch spätere Resorptionsvorgänge mit ihrem gesteigerten Stoffwechsel ein günstigeres Milieu für die wuchernden Tumorzellen geschaffen wurde. Auffallend ist immerhin, daß ein bis dahin in seinen Erscheinungen völlig latent gebliebener Tumor in der relativ kurzen Zeit von 5 Monaten plötzlich diese rapiden Wachstumsercheinungen zeigt und bei der Operation eine Riesenausbreitung besitzt. Hinweisend auf eine eventuelle Verpflanzung von Tumorzellen durch das Trauma scheint mir auch das schnelle Auftreten des Recidivs trotz eingehendster Ausräumung sämtlicher verdächtiger Tumormassen und nachfolgender Röntgenbestrahlung. Sauerbruch hat auf dies Wachstum begünstigende Moment einer Blutungs- oder Heilungs-Hyperaemie hingewiesen (siehe Anfangsteil).

Fall 7 und 15, Balalzellenkreble, können nach der Aufstellung Herxheimers als Abart des Plattenepithelcarcinoms angesehen werden. Von der tiefsten Epithelschicht ausgehend, wuchern sich abflachende Epithelien in langen Strängen in das gesunde Gewebe hinein. Sie zeigen keine Neigung zur Verhornung, dagegen zu zentraler Nekrose und durch Ausfall solcher nekrotischen Massen gebildeten Hohlräumen bis zur Bildung einer Art von Cysten. Hyalintstümige Entartung kann sie leicht als Cylindrome diagnostizieren lassen. Ein anderer Ausgangspunkt für Balalzellenkreble können die Balalzellen der Zahnleiste oder der Zahnlackchen werden. Fall 8 läßt letztere Entstehungsart mit in Frage ziehen. Die Diagnose Peritheliom ließ einen Verdacht auf Balalzellen-carcinom offen. Interessant ist, daß auch bei Fall 16 der Tumor zunächst bei der ersten Probe-Excision als Peritheliom bezeichnet wurde. Gerade Peritheliome können in ihren Entartungsformen, wo es nach hyaliner Aufquellung der Gefäße in der Regel zu Obliteration und Verödung der Gefäße kommt, bei Schwinden des eigentümlichen perithelialen Charakters, durch die hyaline Abkapselung in das Stroma eine Unterscheidung von einem Balalzellenkrebs schwierig machen.

Ein Fall von Adenocarcinom (Fall 18) zeigt das Vorkommen auch dieser Geschwulstart im Oberkiefer. Ihre Morphologie und ihr histologisches Bild sind bereits im Anfang näher beleuchtet.

Fall 13 wurde histologisch nicht sicher als bösartiger Tumor erkannt. Es muß aber die Diagnose malignes Neoplasma auf Grund des destruierenden Wachstums (breite Zapfen schoben sich ins Siebbein und auch der Knochen der Jochbogengegend war zerletzt) mit größter Wahrscheinlichkeit gestellt werden. Hier muß noch erwähnt werden, daß es sicher häufig vorkommt, daß probeexcidierte Stückchen eines Tumors noch nicht einen malignen Charakter des Gewebes zeigen, obwohl der Tumor in seinen Erscheinungsformen als durchaus bösartig auffällt.

Ein Ueberblick über die Symptomatologie der angeführten Tumoren zeigt eine Uebereinstimmung mit den bereits erwähnten Beschwerden, die maligne Oberkiebertumoren verursachen können. Zweidrittel aller Patienten klagten über Ausfluß aus der Nale, der zum Teil blutig-wässerig, zum Teil eitrig und foetide war. Letzterer Umstand läßt immer schon ein vorgeschrittenes Stadium vermuten.

Leider sind ja gerade bei den Oberkiefertumoren die Beschwerden anfänglich minimal, die Patienten achten kaum darauf und kommen meistens erst, wie auch die vorangestellten Fälle zeigen, zur Behandlung, wenn sichere Schäden nachgewiesen werden können. Leider nimmt damit aber auch die Aussicht auf Heilung durch eine radikale Therapie bedeutend ab. Neben dem Ausfluß aus der Nase führt oft eine behinderte Nasenatmung die Kranken zum Arzt. Diese ohne Schnupfen einhergehende Verstopfung der Nase wird bedingt durch maligne Granulationen, die sich von der Kieferhöhle aus in die Nase hineinschieben, ebenso können hypertrophische Muscheln die Nasenatmung behindern. In 9 Fällen ließ sich dieses Symptom auf einer oder beiden Nasenhälften nachweisen, bei Fall 16 war durch die einseitig einwuchernden Tumormassen das Septum zur anderen Seite herübergedrängt, sodaß durch die Deviation auch diese Seite verlegt war. Die einwuchernden Granulationen können sich in vorgerückteren Stadien bis in die Choanen und den Nasenrachenraum erstrecken, Fall 14, 17 und 20 bieten Beispiele dafür. Eine ganze Anzahl der Fälle zeigt als diagnostisches Zeichen eine Veränderung des Gesichtsskeletts. Fall 4, 5, 7 und 17 ließen eine Vorwölbung in der Wangengegend erkennen, hervorgerufen durch Schwellung der facialis Wand der Kieferhöhle, 3 andere Patienten zeigten eine Auftreibung der Infraorbitalgegend, die also vom Dach der Kieferhöhle ausging. Daß bei weiterem Wachstum hierdurch eine *Protusio bulbi* hervorgerufen werden kann, ja selbst schwere Sehstörungen eintreten können, wurde bereits erwähnt. Fall 7 zeigte so bei seiner Aufnahme einen *Exophthalmus* und Doppelsehen, die Sehkraft des linken Auges war fast ganz zerstört. Daß diese Erscheinungen einen weitvorgeschrrittenen Prozeß beweisen, ist wohl einleuchtend; ist es einmal soweit, so kommt meist alle Hilfe zu spät, selbst eine *Enucleatio bulbi* kann in solchen Fällen kaum noch retten. An dem erwähnten Fall kann man das traurige Ausgangsbild eines zuspät zur Behandlung gekommenen Tumors beobachten. Im Verlauf des Wachstums der Geschwulst werden Orbita, Siebbein und Keilbeinhöhle durchwuchert, der Nervus opticus und die Carotis ummauert, ja selbst Sella turcica und Hypophyse vom Tumor durchwachsen. Die Patienten leiden natürlich unter den gräßlichsten Kopfschmerzen und müssen dauernd unter der Wirkung eines Narkotikums stehen, das einzige Hilfsmittel, das ihnen der Arzt bieten kann. Fall 17 zeigt ein ähnlich trauriges Bild.

Auch hier ein Exophthalmus auf Grund eines Tumors. Trotz gründlichster mehrmaliger Operation, es fand sogar eine Enucleatio bulbi statt, schreitet der Tumor in seinem destruirenden Wachstum weiter und bricht dann in die Schädelbasis ein. Die Erscheinungen am Auge führen die Patienten oft zuerst zum Augenarzt. Wie Fall 17 wurde auch Fall 9 von der Augenklinik überwiesen. — Wie das Dach der Kieferhöhle, so kann auch der Boden derselben vom Tumor vorgewölbt, ja sogar perforiert werden. Das zeigen Fall 8, 12 und 17, bei denen eine Vorwölbung der Gaumenplatte gefunden wurde, bei Fall 11 wurde eine Kommunikation von Mund- und Kieferhöhle durch einen etwa daumengroßen Knochendefekt nachgewiesen. — Nicht alle Patienten klagen über Schmerzen, doch werden häufig Kopfschmerzen als Beschwerden angeführt. Wahrscheinlich sind sie neuralgischen Charakters, hervorgerufen durch den Druck des Tumors auf bestimmte Nervenäste, Kieferschmerzen, die ebenfalls angegeben werden, lassen sich erklären durch den zunehmenden Druck der wachsenden Geschwulst auf die Wände der Höhle. Viele Oberkiefergeschwülste können aber völlig schmerzlos verlaufen, auf keinen Fall darf fehlender Schmerz die Diagnose negativ beeinflussen.

Die Therapie der behandelten Fälle bestand an der hiesigen Klinik zum größten Teil in einer radikal chirurgischen, und zwar in der einseitigen oder doppelseitigen Oberkieferresektion nach der Methode Denkers. Sehr gut bewährt hat sich eine postoperative Diathermieverföhrung der ganzen Mundhöhle bis weit ins Gesunde hinein. Die Vor- und Nachteile dieser Methode sind bereits erwähnt. Zwei Fälle kamen in soweit vorgeschrittenem Stadium zur Behandlung, daß eine Operation aussichtslos erschien. Bei Fall 9 konnte man mittels Röntgenstrahlen, die in 4 Sitzungen angewandt wurden, eine 3monatige Besserung erzielen, dann aber vermochten auch sie dem zerstörenden Wachstum des Tumors keinen Einhalt mehr zu gebieten. Wie bei Fall 7 und 20 konnte man nur noch durch dauernde Darreichung eines starken Narkotikums dem Patienten seine Qualen erleichtern. Eine Röntgennachbestrahlung wurde in einem Drittel der Fälle angewandt, leider zeigten sich keine sicheren Erfolge, da bei allen Fällen nach einigen Monaten Rezidive auftraten. Auch die Radiumnachbehandlung kann keine sicheren Heilungen aufweisen, in 3 Fällen angewandt, zeigt sie allerdings in einem Fall (Fall 13) eine über dreijährige Rezidivfreiheit. Es sei noch

einmal darauf hingewiesen, daß bis heute die Ansichten über die Wirkungen der Strahlentherapie weit auseinandergehen und die Frage ihrer Nützlichkeit noch offen gelassen werden muß.

Die Prognose, die bei den einzelnen Fällen zu stellen war, mußte fast für alle Patienten sehr zweifelhaft erscheinen, denn alle kamen erst in ziemlich vorgeschrittenem Stadium zur Untersuchung und Behandlung, ja einzelne verweigerten die Operation, obwohl man sie auf ihren schweren Krankheitszustand eingehend aufmerksam machte. Die Patienten waren auch zum größten Teil in höherem Alter, sodaß eine Anzahl der Todesfälle auf den vom Alter geschädigten Kreislauf zurückzuführen ist, der den Operationschäden nicht mehr gewachsen war. Bei einem Drittel der Fälle trat der Tod infolge Herzschwäche ein. Fall 18 zeigte bei der Obduktion als Todesursache Fettembolie der Lunge, die während der Operation infolge der Koagulation des Fettgewebes eingetreten war. Zwei Fälle wiesen eine Pneumonie auf, die man sich durch Aspiration vom jauchigen Material entstanden denken kann.

Metastasen konnten zu Lebzeiten der Patienten nur in zwei Fällen festgestellt werden, so bei Fall 12 und 19, wo man Drüenschwellungen des Halses fand. Weitere Metastasen fanden sich bei der Sektion in Fall 7, 16 und 17, und zwar einmal (Fall 7) war die Leber von kirschkern- bis erbsengroßen Tumorknoten durchsetzt, desgleichen die linke Nebenniere von Tumormassen durchwachsen, in den beiden anderen Fällen Lunge und Pleura davon ergriffen. Im allgemeinen kommt es bei den malignen Oberkiefertumoren relativ selten zu Metastasen in anderen Organen.

Interessant ist Fall 20, der als einziger ein Oberkieferfarkom zeigt. Die Symptome, unter denen es auftrat, sind die gleichen wie beim Carcinom. Obwohl anfangs durch Röntgenstrahlen weitgehende Besserung erzielt werden konnte, so daß man fast an eine vollständige Heilung dachte, zeigte auch diese Geschwulst bereits nach 6 Monaten ein ausgesprochenes Recidiv und offenbarte damit ihren durchaus bösartigen Charakter, der zum 2. mal auch von den Röntgenstrahlen nicht beeinflußt werden konnte.

Die Gliome, die Pat. bereits als 4 jähriges Kind hatte, lassen überlegen, ob man bei der Pat. nicht eine allgemeine individuelle Disposition zur Geschwulstbildung voraussetzen kann. Damit wäre die Dispositionstheorie bestätigt.

Wenn wir die Erfolge bzw. Nichterfolge der Behandlung überblicken, sehen wir, daß von den 17 kombiniert, teils blutig-chirurgisch, teils elektrochirurgisch, mit Bestrahlung vor bzw. nach dem Eingriff behandelten Patienten

- 2 als vorläufig geheilt zu betrachten sind,
- 1 Fall starb nach einem Jahr, ohne Recidiv, an einer intercurrenten Krankheit,
- 4 Fälle starben an den Folgen der Operation,
- 10 Kranke starben nach längerer oder kürzerer Zeit an einem Recidiv,
- 2 ausschließlich der Strahlenbehandlung unterzogenen Patienten starben ebenfalls an Recidiv,
- 1 Fall wurde nur symptomatisch behandelt und kam bald nach Eintritt in die Klinik zum Exitus.

Die Resultate sind keineswegs als gut zu bezeichnen. Dies hängt wohl hauptsächlich damit zusammen, daß es sich um weit vorgeschrittene Fälle handelte.



Literatur-Verzeichnis:

- I) Siehe einschlägige Literatur in den Lehrbüchern von Alchoff, Worft, Denker-Kahler, Henke-Lubarich, Herxheimer, Kirchner-Nordmann.
- II) Abderhalden:
 - Abwehrfermente. (Berlin: Julius Springer).
- Achard, Maurice et Louis Guieu:
 - Diagnostic des tumeurs des maxillaires. (Revue de Stomat. 30, 1928).
- Ambrumjanz, G. N.:
 - Eine neue Methode zum Schutz des Auges vor Senkung bei Oberkieferrefektionen. (Zentral-Bl. f. Chir., Band III, 1927).
- Arzt und Kerl:
 - Ueber die Verwertbarkeit der Freund-Kaminer'schen Reaktion. (Wien, Klin. Wochenschr. 1912, Nr. 46).
- Barnes, Hary A.:
 - Malignant tumors of the nasal sinuses. A further report on the results of the wide open operation followed by immiedial radiation, (Archiv of Otolaryngolo, Band 6, Nr. 2, 1927).
- Béclère, A.:
 - La radiosensibilité des cellules néoplastiques. (Zentr. Bl. f. Chir. 1926, Bd. 3).

- Berak, J. und Driak, F., Wien:
Untersuchung bei röntgenbestrahlten Melanofarkomen.
(Int. Radiumtherapie, Bd. 2).
- Billroth:
Ueber Alveoläre Sarkome. (Arch. f. klin. Chir. Bd. 2).
- Birkett, G. E.:
Radium Treatment in carcinoma of the mouth and
tongue. (Zentr. Bl. f. Nat.-Hals-Ohr.-Heilk., Bd. 12, 1928).
- Bogoljubow, W. L.:
Ueber die Prophylactische Unterbindung der Carotis
externa bei Oberkieferresektion. (Z. Bl. f. Chir. 1927,
Band 1).
- Bonnet-Roy, F.:
Epithélioma du maxillaire supérieur. (Z. Bl. für Nat.-
Hals-Ohr.-Heilk. 1928, Bd. 12).
- Brachetto-Brian, D.:
Fundamentos biológicos de la radioterapia de los
tumores malignos. (Z. f. Chir. 1927, Bd. 2).
- Broders, Rochester:
Carcinoma of the mouth, types and degrees of ma-
lignancy. (Intern. Rad.-Therapie, Bd. 2).
- Camyt, Georges:
Epithélioma inopérable et envahissant la cavité buc-
cale (Palais osseux) et les deux fosses nasales. Radio-
Thérapie profonde. Guérison maintenue depuis trois
ans et demi. (Z. f. N. H. Ohr.-Heilk. 1927, Bd. 1).
- Casadésus y Landete:
Ein neues diagnostisches Zeichen für die malignen
Tumoren der Kieferhöhle. (Z. Bl. f. Chirg. 1926, Bd. 8).
- Euler, Hermann:
Das Verhalten der Zähne bei malignen Kiefertumoren.
(Med. Wochenschr., Jahr. 5, Nr. 1).
- Ewing, James:
Some phasis of intra-oral tumors with special referents
to treatment by radiation. (Z. Bl. f. N. H. O.-Heilk. 1928,
Band 12).
- Ferreri, G. (Rom):
Sulla radium chirurgia nei tumori maligni dell' et-
moide e dell' mascellare superiore. (Intern. Radio-
Therapie, Bd. 2).
- Fischer Albert:
Humorale und celluläre Wachstumsfaktoren für Krebs-
zellen. (Zeitschr. f. Krebsf. 1928, Bd. 26).
- Fischer-Wasels:
Das Geschwulst-Problem. (D. Med. Wochenschr. 1928,
Nr. 28).
- Franci, G. B.:
Ueber eine Kieferprothese zwecks Einbringung von
radioaktiven Substanzen in die Mundhöhle. (Zeitschr.
f. d. gesamte physikalische Therapie 1927, Bd. 3).
- Freund, Ernst und Kammer, Gisa:
Biochemische Grundlagen der Disposition für Carci-
nom. (Wien, Verl. J. Springer 1925).

- Grier, G. W. Pittsburg:
The treatment of malignant diseases in the mouth.
(Intern. Rad.-Therapie, Bd. 2).
- Grunert:
Operation oder Beirahlung des Krebses? (Zeitschr.
f. ärztl. Fortbildung, Jahrg. 24, Nr. 4).
- Halberstädter, L., Berlin:
Zur Radiumbehandlung d. Mundhöhlenkrebses. (Zeitschr.
f. Krebsforsch. 1928, Bd. 27).
- Hauford, C. W.:
Radium incancer of the mouth. (Zeitschr. für die g.
physikalische Therapie 1927, Bd. 1)
- Häupl:
Ueber Riefenzellensarkome im Bereich der Kiefer.
(Klin. Wochenschr. Jahrg. 6, Nr. 17).
- Hautant, A. O. Monod et G. Verger:
Traitement des épithéliomas du maxillaire supérieur
par l'association chirurgie-curiethérapie. (Zentr. f.
N. H. O. Heilkunde 1927, Bd. 10).
- Heyderdahl, S. A., Oslo:
On radium treatment of sarcomata in the oral cavity
and the pharynx. (Intern. Rad.-Ther., Bd. 2, 1926/27).
- Hirt, Willi:
Oberkieferosteom bei einem 17-jährigen Mädchen. (Bresl.
Chirurg. Gesellsch. 3/12. 28).
- Hofmann, Lotar:
Contribution à l'étude histologique et clinique des ostéo-
et chondro-sarcomes du maxillaire supérieur. (Zentr.
f. N. H. O. Heilkunde 1927, Bd. 9).
- Holmgren, Gunnar:
Erfahrungen über die chirurg. Behandlung von malignen
Oberkiefertumoren. (Zentr. Bl. f. Chirg. 1926, Bd. 8)
- Holzknacht, Guido:
Klinische Prognostik der Strahlentherapie bei den
Carcinomen. (Intern. Rad.-Therapie, Bd. 3).
- Kahlström, A.:
Die histologische Prognose bösartiger Gewächse. (Ein
kritisches Sammelreferat). (Z. f. Krebsforsch. 1928, Bd. 26).
- Kaufmann:
Spezielle pathologische Anatomie I.
- Kilgore, Alton, R. and W. Edward Chamberlain:
Carcinoma of maxillary antrum of 20 years' duration.
(Zentr. Bl. f. Chirurg. 1926, Bd. 9).
- Kraus, R.:
Ueber den gegenwärtigen Stand der Ätiologie maligner
Tumoren. (Z. Bl. f. Chirg. 1927, Bd. 1).
- Leguini, Arminio:
Sintomologia oculare nei tumore dei seni della faccia.
(Augensymptome bei Geschwülsten der Gesichtshöhlen).
(Z. f. N. H. O. Heilk. 1926, Bd. 13).
- Lewin, Karl:
Die Chemotherapie der malignen Geschwülste. (Zeitschr.
f. Krebsforsch. 1928, Bd. 27).

- Lexner und von Seemen:
Refektion eines Oberkiefercarcinoms in Verbindung mit Elektrocoagulation. (Z. Bl. f. Chirg. 1930, Bd. 3, Sitzungsbericht).
- Lindemann, A.:
Neue Wege der Anaesthesirum der Kiefer und deren Umgebung. (D. Zeitschr. f. Chir., Bd. C 10, C 9, 1926)
- Lindemann, A.:
Zur Pathologie und Therapie der malignen Tumoren des Kiefergebietes. (Deutsche Zahnheilk., Jahrg. 1928, Heft 73).
- Link, A.:
Röntgenbild, Empyem und Frühdiagnose bei Nebenhöhlen-Geschwülsten. Ein Beitrag zur rhinologischen Geschw.-Diagnostik. (Z. f. N. H.-O. Heil. 1928, Bd. 21).
- Maragliano, Genua:
2 problema della radio-e radium-terapia nel trattamento pre-e postoperativ del cancro. (Z. Bl. für Chirg. 1926, Bd. 2).
- Mayer:
Wesentliche Steigerung des Röntgen-Effektes bei Tumoren. (Z. Bl. f. Chirg. 1926, Bd. 3).
- Mayer, Otto:
Durch Radiumbestrahlung geheilter Fall von inoperablen Carcinom der Kieferhöhle. (Wiener med. Wochenschrift, Jahrg. 76, Nr. 16)
- Moir, P. I.:
The treatment of carcinoma of the mouth. With an analysis of 204 consecutive cases. (Zeitschr. f. d. ges. phys. Therapie 1927, Bd. 3).
- Monod, Robert:
Voluminöse Tumeur du maxillaire supérieur. Traitement chirurgical. Guérison. (Zentr. Bl. f. Chirg. 1929, Bd. 13).
- Moral, Hans:
Spezielle Pathologie der Mundhöhle. (Fortchr. d. Zahnheilkunde 1926, Bd. 2).
- Morgan, J. Douglas:
The treatment of malignant neoplasms in the mouth. (Z. Bl. f. N. H. O. Heilk. 1927, Bd. 14).
- Mysch, W.:
Lokalanästhesie bei Oberkieferrefektion. (Z. Bl. für Chir. 1927, Bd. 1).
- New, Gordon, B.:
Malignant tumors of the antrum of highmore. End results of treatment. (Z. Bl. f. N. H. O. Heilk. 1926, Bd. 9)
- Pichler, H.:
Wann soll der praktische Arzt an Neubildung in der Mundhöhle denken und welche diagnostischen Mittel stehen ihm zur Verfügung? (Wiener Klin. Wo.-Schr. Jahrg. 39, Nr. 11)
- Piponius, A.:
Zwei erfolgreich mit Röntgen behandelte Fälle von Sarkom. (Z. Bl. f. N. H. O. Heilk. 1927, Bd. 11).

- Quick, Douglas:
Prevention and early recognition of intra-oral-cancer.
(Z. Bl. f. N. H. O. Heilk. 1928, Bd. 14).
- Quick, Douglas:
The use of radium and x-rays in the treatment of malignant disease of the paranasal sinuses. (Z. Bl. f. N. H. O. Heilk. 1927, Bd. 9).
- Reckow, J. V.:
Ein Beitrag zum Carcinom d. Oberkiefers. (D. Monatschrift f. Zahnheilk. 1929, Nr. 47).
- Reichert:
Ueber bazillogene Tumoren und tumorerzeugende Faktoren. (D. Med. Wo.-Schr. 1925, Nr. 32).
- Reimann, Stanley, P.:
Der Wert der Gradeinteilung von Geschwülsten. (Z. Bl. f. Allg. Pathologie und path. Anatomie, 1929, Bd. 47).
- Ribas, Isern, L.:
Ueber Radium-Therapie mittels plastischer Substanzen beim Mundhöhlenkrebs. (Z. Bl. f. N. H. O. Heilk. 1927, Bd. 13).
- Risak, Erwin:
Zur Klinik u Statistik d. bösartigen Kiefergeschwülste. (Arch. f. klin. Chirg. 1927, Bd. 147).
- Rofenthal, Wolfgang:
Beitrag zur Wiederherstellungschirurgie nach Kieferresektion und Nekrose. (Arch. f. klinische Chirg. 1927, Bd. 147).
- Rostock:
Ergebnisse der Röntgenbestrahlung bei Sarkomen. (Münch. Med. Woch.-Schr., Jahrg. 74, Nr. 40).
- Sauerbruch:
Geschwulst und Trauma. (Deutsche Z. Schr. f. Chirg. Bd. C 10, C 9, 1926).
- Saxim, Arno:
Ueber die pathologische Anatomie der von der Nasencavität und der Kieferhöhle ausgehenden Carcinome und Papillome. (Z. Bl. f. N. H. O. Heilk. 1926, Bd. 8).
- Simpson, F. E., Chicago:
The treatment of intro-oral cancer with radium ameration. (Intern. Radio-Ther., Bd. 2).
- Teutschländer:
Infektion und Krebs. (Zeitschr. f. Krebsforschung 1927, Bd. 24).
- Thompson, G. H.:
Malignant neoplasma of the antrum. (Z. Bl. f. N. H. O. Heilk. 1928, Bd. 11).
- Uhlhorn:
Ueber Carcinom im jugendlichen Alter. (D. Zeitschr. f. Chirurgie 193, Heft 1 und 2).
- Woelk, H. A.:
Ueber das Carcinomfarcom, seine Diagnose und Benennung und anscheinend geheiltes Carcinom des Oberkiefers. (Z. Schr. f. N. H. O. Heilk. 1926, Bd. 14).

Lebenslauf.

Ich, Liselotte Witkop, Tochter des Kaufmanns Josef Witkop und seiner Ehefrau Elisabeth, geb. Menfing, wurde am 22. September 1906 in Gelsenkirchen in Westfalen geboren. Dort besuchte ich die Volksschule und die realgymnasiale Studienanstalt Aloisianum, wo ich am 24. Mai 1926 mein Reifezeugnis erhielt. Seit dem Sommersemester 1926 widmete ich mich dem medizinischen Studium und verbrachte zunächst drei Semester in Freiburg i. Br. Hierauf war ich zwei Semester in Bonn a. Rh., wo ich auch meine medizinische Vorprüfung am 2. August 1928 ablegte. Im Wintersemester 1928/29 war ich in München, im Sommersemester 1929 in Wien. Darauf hörte ich im Wintersemester 1929/30 an der Universität in Frankfurt und verbrachte die letzten drei Semester wiederum in Freiburg, wofür ich am 14. Dezember 1931 mein Staatsexamen bestand.

